

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS/DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Blockbodenbeutel}

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Brennnesselblätter

Arzneitee

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

2. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE

Pflanzliches Arzneimittel traditionell angewendet zur Durchspülung der Harnwege sowie bei Gelenkschmerzen.

3. ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet zur Durchspülung der ableitenden Harnwege, unterstützend bei leichten Harnwegsbeschwerden.

Traditionell angewendet zur Linderung leichter Gelenkschmerzen.

Diese Anwendungen stützen sich ausschließlich auf die langjährige Anwendung des Arzneimittels in den Anwendungsgebieten.

4. ART DER ANWENDUNG

Art der Anwendung

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

Bitte Packungsbeilage beachten.

5. GEGENANZEIGEN

Gegenanzeigen

Brennnesselblätter dürfen nicht angewendet werden, bei Überempfindlichkeit gegenüber Brennnesseln, bei Wasseransammlungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- und/oder Nierentätigkeit und bei empfohlener Reduzierung der Flüssigkeitsaufnahme aufgrund von bestehenden Erkrankungen.

6. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Durchspülung der ableitenden Harnwege

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren sowie bei Verschlechterung der Beschwerden oder Auftreten von Beschwerden wie Fieber, Schmerzen beim Wasserlassen, krampfartigen Schmerzen, akuter Harnverhaltung oder bei Blut im Urin muss ein Arzt aufgesucht werden.

Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen sowie andauernden oder periodisch wiederkehrenden Beschwerden ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Brennnesselblätter anwenden.

Kinder

Kinder unter 12 Jahren

Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung nicht empfohlen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Daher wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

7. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN UND NEBENWIRKUNGEN

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln im angegebenen Dosierungsbereich bekannt geworden.

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Leichte Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und Hautreaktionen (z. B. Juckreiz, Ausschlag, Nesselsucht) können auftreten.

Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

8. DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Dosierung und Art der Anwendung

Erwachsene einschließlich Ältere und Jugendliche ab 12 Jahren trinken 3- bis 6-mal täglich 1 Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses:

3 Teelöffel (ca. 2 g) Brennnesselblätter mit 150 ml siedendem Wasser übergießen und zugedeckt etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen.

Auf zusätzlich reichliche Flüssigkeitszufuhr ist zu achten.

Kinder unter 12 Jahren

Die Anwendung ist nicht vorgesehen.

Dauer der Anwendung

Durchspülung der ableitenden Harnwege

Nicht länger als 2 bis 4 Wochen.

Anwendung bei leichten Gelenkschmerzen

Nicht länger als 4 Wochen.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

9. HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Arzneimittel für Kinder unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

10. ZUSAMMENSETZUNG, DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Zusammensetzung, Darreichungsform und Inhalt

50 g Arzneitee enthalten 50 g Brennnesselblätter

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Salus Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 24
83052 Bruckmühl
info@salus.de

12. STAND DER INFORMATION

Stand der Information: Oktober 2024

13. ZULASSUNGSNUMMER/REGISTRIERUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 2479.99.99

14. CHARGENBEZEICHNUNG/VERFALLDATUM

Ch.-B.:
Verwendbar bis:

15. VERKAUFSABGRENZUNG

16. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

[Brennnesselblätter]

17. WEITERE ANGABEN

– *Urticae folium* –

Aus ökologischem Landbau

Zur Durchspülung der Harnwege sowie bei Gelenkschmerzen

50 g