



83

Eupatorium F Komplex

Homöopathisches
Arzneimittel

Mischung zum Einnehmen

Zusammensetzung:

10 g (= 10,87 ml) Mischung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Eupatorium perfoliatum Dil. D3, Bryonia Dil. D3, Aconitum Dil. D4, Ignatia Dil. D4, Senega Dil. D4, Malva silvestris (HAB 1934) Dil. D2 (HAB, V. 3a), Kalium bichromicum Dil. D4, Arum maculatum Dil. D4, Sambucus nigra Dil. D2 je 1,1111 g
Dieses Präparat enthält 55,7 Vol.-% Alkohol.

Packungsbeilage beachten!

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Nicht über 25 °C lagern.

Req.-Nr.: 61637.00.00

Ch.-B.: 0000

Apothekenpflichtig

Inhalt: 50 ml

Verwendbar bis 00/0000

Gebrauchsinformation

83 Eupatorium F Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Mischung, Originalpackungen zu 20 und 50 ml

1 g entspricht 22 Tropfen

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne

Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweise: siehe Rückseite.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 83 Eupatorium F Komplex nicht einnehmen?

83 Eupatorium F Komplex soll wegen des Alkoholgehaltes bei

Alkoholkranken sowie bei einer Chromüberempfindlichkeit

nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie 83 Eupatorium F Komplex erst nach

Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll 83 Eupatorium F Komplex

bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen

Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem

Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 55,7 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung

werden bei der Akutdosierung bis zu 0,65 g Alkohol und bei

der chronischen Dosierung bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken,

Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder

Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die

Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder

verstärkt werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit

beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur

Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen,

sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt

angewendet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine

ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb

bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle

halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen

vor bzw. zwischen den Mahlzeiten mit einem Teelöffel Wasser

einnehmen. Die Einnahme sollte ohne medizinischen Rat

nicht länger als 1 Woche erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5 Tropfen mit

einem Teelöffel Wasser einnehmen. Bei Besserung der

Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten, das Mittel ist

dann abzusetzen. Hinweis: siehe Rückseite.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: siehe

Rückseite

Stand der Information: April 2016