



Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Flenin SCHUCK

Homöopathisches Arzneimittel

Indikationsgruppe:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung dieses Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Flenin SCHUCK nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Flenin SCHUCK nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen. Weiteres siehe unter Vorsichtsmaßnahmen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte Flenin SCHUCK nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie bei Kindern beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. 1 g Flenin SCHUCK entspricht 40 Tropfen. In der maximalen Einzeldosis von 5 Tropfen sind 60 mg Alkohol enthalten.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt. Warnhinweise: Enthält 45 Vol.-% Alkohol.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung, Dauer der Anwendung:

Wie viel, wie oft und wie sollten Sie Flenin SCHUCK anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

bitte wenden!

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie Flenin SCHUCK anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Die Akutdosierung ist in der Regel nicht länger als einige Tage (maximal 1 Woche) anzuwenden. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Hinweise für den Fall der Überdosierung, der unterlassenen Einnahme oder Hinweise auf die Gefahr von unerwünschten Folgen des Absetzens:

Bei unterlassener Einnahme oder Absetzen von Flenin SCHUCK ergeben sich keine unerwünschten Folgen.

Was ist zu tun, wenn Flenin SCHUCK in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung)?

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels werden bis zu 40 g Alkohol (bei der Einnahme des gesamten 100 ml-Flascheninhaltes) aufgenommen; dies kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Fragen zur Klärung der Anwendung ist der Arzt oder Apotheker zu befragen.

Nebenwirkungen:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Flenin SCHUCK soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr angewendet werden.

Zusammensetzung:

1 ml enthält: Wirkstoffe: 0,01 ml Acidum arsenicosum Dil. D4, 0,01 ml Conium maculatum Dil. D2, 0,01 ml Echinacea Dil. D2, 0,01 ml Marsdenia cundurango Ø, 0,01 ml Secale cornutum Dil. D2, 0,02 ml Viscum album Ø; sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), gereinigtes Wasser. Enthält 45 Vol.-% Alkohol.

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackungen mit 30 ml und 100 ml.

Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:

SCHUCK GmbH, Industriestr. 11, 90571 Schwaig, Tel. 0911/500185, Fax 0911/508802, E-Mail: info@schuck-arzneimittel.de, www.schuck-arzneimittel.de

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25° C lagern!

Datum und Fassung der Packungsbeilage: Januar 2008

Reg.-Nr.: 56056.00.00