



Biochemie Nr.
8
Natrium
chloratum
D12

Biochemisches Funktionsmittel Nr. 8 nach Dr. Schüßler
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten zum Einnehmen
Zusammensetzung: 1 Tablette enthält:
Wirkstoff: Natrium chloratum D12 Trit. 250 mg
Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.
Enthält Lactose. Gebrauchsinformation beachten!
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe
einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung
fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat
einzuholen.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Nicht über 25 °C aufbewahren. Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 5355 55.53 Inhalt: 100 Tabletten
Ch.-B.: 1777 **Verwendbar bis 00/0000**

Gebrauchsinformation
Biochemie Nr. 8 Natrium chloratum D12
Homöopathisches Arzneimittel
Tabletten
Originalpackung mit 100, 400 und 1000 Tabletten
Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweise: siehe Rückseite.
Gegenanzeigen: Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und
Warnhinweise:
Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit

beachten? Da keine ausreichend dokumentierten
Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der
Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit
dem Arzt angewendet werden.
Besondere Hinweise zur Anwendung im Kindesalter:
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen
keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es
soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht
angewendet werden.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie
Biochemie Nr. 8 Natrium chloratum D12 daher erst
nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen
bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit
gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Keine bekannt. Allgemeiner Hinweis: siehe Rückseite.
Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:
Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und
Kinder ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe
bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 1 Tablette
vor bzw. zwischen den Mahlzeiten im Mund zergehen.
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung
sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch
erfahrenen Therapeuten erfolgen.
Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1
Tablette im Mund zergehen lassen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der
Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung: siehe Rückseite.
Hinweise für den Fall der Überdosierung:
Was ist zu tun, wenn Biochemie Nr. 8 Natrium
chloratum D12 in zu großen Mengen eingenommen
wurde? Bei der Einnahme größerer Mengen des
Arzneimittels kann es bei Personen mit
Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu
Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine
abführende Wirkung auftreten.
Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Hinweis: siehe Rückseite.
Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des
Arzneimittels: siehe Rückseite.
Stand der Information: März 2016