

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Rhodizonsäure CP.-Ampullen

Homöopathisches Arzneimittel, Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung des Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Rhodizonsäure CP.-Ampullen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Rhodizonsäure CP.-Ampullen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Rhodizonsäure CP.-Ampullen beachten?
3. Wie sind Rhodizonsäure CP.-Ampullen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Rhodizonsäure CP.-Ampullen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND RHODIZONSÄURE CP.-AMPULLEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Rhodizonsäure CP.-Ampullen ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON RHODIZONSÄURE CP.-AMPULLEN BEACHTEN?

Rhodizonsäure CP.-Ampullen dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe Glyoxal, Methylglyoxal, Trichinoyl und Rhodizonsäure sind.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Anwendung von Rhodizonsäure CP.-Ampullen zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Rhodizonsäure CP.-Ampullen haben keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. WIE SIND RHODIZONSÄURE CP.-AMPULLEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie Rhodizonsäure CP.-Ampullen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Rhodizonsäure CP.-Ampullen nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Rhodizonsäure CP.-Ampullen sonst nicht richtig wirken können!

Soweit nicht anders verordnet, erhalten Erwachsene bei akuten Zuständen 1-3 mal täglich 1 Ampulle, intramuskulär (i.m.), intravenös (i.v.) oder subcutan (s.c.) injiziert. Kinder im Alter von 6-14 Jahren erhalten bei akuten Zuständen 1-3 mal täglich eine halbe Ampulle (1 ml), Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren 1-3 mal täglich 1,5 ml i.m., i.v. oder s.c. injiziert.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen erhalten Erwachsene 1 Ampulle zu 2 ml im Abstand von 2-14 Tagen i.m., i.v. oder s.c. injiziert.

Kinder im Alter von 6-14 Jahren erhalten im Abstand von 2-14 Tagen eine halbe Ampulle (1 ml), Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren 1,5 ml im Abstand von 2-14 Tagen injiziert.

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Rhodizonsäure CP-Ampullen

Wie lange sollten Sie Rhodizonsäure CP-Ampullen anwenden?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Rhodizonsäure CP-Ampullen angewendet haben, als Sie sollten

Von den homöopathischen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in der Apotheke.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an die Apotheke. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND RHODIZONSÄURE CP-AMPULLEN AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Ampulle und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C aufbewahren!

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Rhodizonsäure CP-Ampullen enthalten:

1 Ampulle zu 2 ml enthält an Wirkstoffen:	
Glyoxal Dil. D8 aquos. (HAB, V. 5b)	0,5 ml
Methylglyoxal Dil. D8 aquos. (HAB, V. 5b)	0,5 ml
Trichinoyl Dil. D8 aquos. (HAB, V. 5b)	0,5 ml
Rhodizonsäure Dil. D8 aquos. (HAB, V. 5b)	0,5 ml

Alle Bestandteile werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert (HAB V. 40 b).

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Wie Rhodizonsäure CP-Ampullen aussehen und Inhalt der Packung:

Braunglasampullen mit einer klaren, farblosen Injektionslösung.

Originalpackungen mit 10 Ampullen (N1) und 50 Ampullen (N2) mit je 2 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion.

Pharmazeutischer Unternehmer

Sanorell Pharma GmbH

Sommerhalde 21 • 72184 Eutingen im Gäu

Hersteller

Sanorell Pharma GmbH

Hurststraße 31 • 77815 Bühl / Baden
Tel. 07223 - 9337-00 • Fax 07223 - 9337-50 •
www.sanorell.de


Reg.-Nr.: 2505879.00.00

Apothekenpflichtig

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im April 2024 überarbeitet.

Empfehlung:

Die Dosierung und Art der Anwendung sollte immer mit einem in der „Koch'schen Molekulartherapie“ erfahrenen Therapeuten abgesprochen werden.



Wulf Rabe's Biologische Mittel
www.wulf-rabe.de