

# Gebrauchsinformation



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Inficephalgin® Tropfen

**Inficephalgin® Tropfen sind ein homöopathisches Arzneimittel bei Kopfschmerzen.**

### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

#### **Kopfschmerzen, Migräne.**

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

### **Gegenanzeigen:**

**Inficephalgin® Tropfen** dürfen nicht eingenommen werden

- in der Schwangerschaft und Stillzeit
- bei Kindern unter 6 Jahren

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung :**

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb auch bei Kindern von 6 bis 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Wechselwirkungen:**

Für **Inficephalgin® Tropfen** sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **Warnhinweise:**

Dieses Arzneimittel enthält 63 Vol.-% Alkohol.

Daher sollten Alkoholranke dieses Arzneimittel nicht einnehmen. Leberranke sollten ihren Therapeuten fragen, ob sie dieses Arzneimittel einnehmen dürfen.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit **Inficephalgin® Tropfen** nicht anders verordnet wurden.

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Inficephalgin® Tropfen** sonst nicht richtig wirken können!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **Inficephalgin® Tropfen** einnehmen?*

Soweit nicht anders verordnet gilt für Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Nehmen Sie **Inficephalgin® Tropfen** am besten jeweils nach den Mahlzeiten mit etwas Flüssigkeit ein.

*Wie lange sollten Sie **Inficephalgin® Tropfen** einnehmen?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung:**

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig oder zu viel **Inficephalgin® Tropfen** eingenommen oder eine Anwendung vergessen haben?*

Wenn Sie versehentlich einmal zu wenig oder zu viel eingenommen haben, so setzen Sie bitte beim nächsten Mal die Einnahme von **Inficephalgin® Tropfen** wieder wie üblich fort.

**bitte wenden**

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist unbedenklich.

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Nebenwirkungen:**

Arzneimittel können neben den erwünschten Hauptwirkungen auch unerwünschte Wirkungen, sogenannte Nebenwirkungen, haben.

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **Inficephalgin® Tropfen** auftreten?

Keine bekannt.

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem **Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)** anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Etikett und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

#### **Zusammensetzung:**

Mischung zum Einnehmen

10 ml (= 9,0376 g) enthalten:

##### Wirkstoffe:

Cyclamen Dil. D2	0,8379 g
Iris versicolor Dil. D4	2,9664 g
Pulsatilla pratensis Dil. D3	0,4435 g
Sanguinaria canadensis Dil. D3	3,0158 g

Sonstiger Bestandteil: Ethanol 62 % (m/m)

1 ml entspricht 21 Tropfen

#### **Nicht über 25°C aufbewahren.**

#### **Darreichungsform und Inhalt:**

Bei **Inficephalgin® Tropfen** handelt es sich um eine Mischung, die in Tropfflaschen zu 50 ml und 100 ml erhältlich ist.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer (Zulassungsinhaber):**

Laboratoires Lehning S.A., 3 rue du Petit Marais, F-57640 Sainte-Barbe, Frankreich

#### **Hersteller und Mitvertreiber:**

##### **Infirmarius GmbH**

Daimlerstraße 19-21 · 73037 Göppingen

Telefon 07161/60694-0 · Fax 07161/60694-90

[www.infirmarius.de](http://www.infirmarius.de)

**Stand der Information:** April 2019

---

#### **Arzneimittel sorgfältig und für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

#### **Zusätzliche Hinweise für den Patienten:**

Migräne ist ein anfallartiger, meist halbseitig auftretender heftiger Kopfschmerz, der stunden- bis tagelang anhalten kann. Häufig wird migränöser Kopfschmerz durch Witterungseinflüsse oder Aufregungen ausgelöst. Aber auch bestimmte Nahrungs- und Genussmittel wie Gewürze, Schokolade, Nikotin und Alkohol können Ursache für Migräne-Attacken sein. Vermutlich werden die heftigen Schmerzen durch kurzzeitige Gefäß-erweiterung verursacht. In vielen Fällen wird der Anfall von Übelkeit und Brechreiz begleitet. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder wenden Sie sich an uns.

#### **Infirmarius GmbH**

Daimlerstraße 19-21 · 73037 Göppingen

Telefon: 0 71 61 / 6 06 94 – 0 · Fax: 0 71 61 / 6 06 94 – 90

[www.infirmarius.de](http://www.infirmarius.de)

