



Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Antihyp-Tabletten Schuck

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung dieses Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Antihyp-Tabletten Schuck nicht anwenden?

Antihyp-Tabletten Schuck soll bei Depressionen, Magengeschwüren und bekanntem Phäochromozytom nicht angewendet werden. Antihyp-Tabletten Schuck soll in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Antihyp-Tabletten Schuck ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption leiden.

Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Was müssen Sie vor der Einnahme von Antihyp-Tabletten Schuck beachten?

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Antihyp-Tabletten Schuck daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Wechselwirkungen ergeben sich mit Digitalisglykosiden, Neuroleptika, Barbituraten, Levodopa und Sympathikomimetika.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise:

Wegen des sonstigen Bestandteils Lactose-Monohydrat kann es bei der Einnahme größerer Mengen (über 80 Tabletten auf einmal) des Arzneimittels bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Laktoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden oder zu einer abführenden Wirkung kommen.

bitte wenden!

Dosierungsanleitung mit Art der Anwendung, Dauer der Anwendung:

Wie viel sollten Sie von Antihyp-Tabletten Schuck einnehmen und wie oft?

Soweit nicht anders verordnet: Erwachsene und Kinder über 12 Jahren nehmen bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, je 1 Tablette ein. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen nehmen diese Personengruppen 1-3 x täglich 1 Tablette ein.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie Antihyp-Tabletten Schuck anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Antihyp-Tabletten Schuck in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung)?

Bei der Einnahme größerer Mengen (über 80 Tabletten auf einmal) des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Laktoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise auf den Verfall:

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch der Dose ist dieses Arzneimittel noch 6 Monate haltbar.

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Wirkstoffe: 30 mg Cactus Trit. D3, 20 mg Glonoinum Trit. D4, 3,2 mg Rauwolfia Trit. D2, 30 mg Viscum album Trit. D3; sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat (Ph. Eur.) pflanzlich, Lactose-Monohydrat.

Inhalt nach Stück, Darreichungsform:

Tabletten zum Einnehmen: 50, 250, 450 .

Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:

SCHUCK GmbH, Industriestr. 11, 90571 Schwaig, Tel. 0911/500185, Fax 0911/508802, E-Mail: info@schuck-arzneimittel.de, www.schuck-arzneimittel.de

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25 °C lagern!

Apothekenpflichtig!

Datum und Fassung der Packungsbeilage: Juni 2010

