

apomix®

## Ethacridinlactat-Lösung 0,1 Prozent

1000 g

Ch.-B.:

verwendbar bis:

Nach Ablauf der Verwendbarkeitsfrist nicht mehr anwenden!

### Zur Bereitung von Teilbädern und Umschlägen Zur lokalen Anwendung als Antiseptikum

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**  
Soweit nicht anders verordnet, 2mal täglich Ethacridinlactat-Lösung  
0,1 Prozent örtlich für wenigstens 30 Minuten einwirken lassen.

**Gegenanzeigen:**  
Gegenanzeigen zur lokalen Anwendung bestehen nicht.

**Nebenwirkungen:**  
Selten kommt es zu Entzündungsreaktionen der Haut. In Einzelfällen  
ist das Auftreten von Schwellungen im Gesicht, Nesselsucht  
(Urtikaria), Kopfschmerzen und Krämpfen bekannt geworden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**  
Ethacridinlactat-Lösung 0,1 Prozent nicht mit anderen Lösungen  
mischen, da es sonst zu Ausflockungen kommen kann.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**  
Keine Anwendung an der Brust während der Stillzeit.

**Gehalt je 100g:** Ethacridinlactat 0,1g, Wasser

Stand: 10/1993

**Vor Licht geschützt lagern!**

**Vor Kindern geschützt aufbewahren!**

**Apothekenpflichtig!**

PZN - 06896552

Zul.-Nr.: 6499.97.97

PKH GmbH 06120 Halle Daniel-Vorländer-Str. 2

002