

# Okoubarell®



**Homöopathisches Arzneimittel**  
**Wirkstoff: Okoubaka aubrevillei**  
**e cort. ramorum sicc. D2 dil.**

Flüssige Verdünnung zum Einnehmen.

**Zusammensetzung**

10 ml enthalten an arzneilich wirksamem Bestandteil:

Okoubaka aubrevillei e cort. ramorum sicc.  
D2 dil. (HAB 1, Vorschrift 4a) 10 ml

Enthält 69 Vol.-% Alkohol (Ethanol).

**Anwendungsgebiete**

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sowie bei Durchfällen, die länger als 2 Tage andauern oder mit Blutbeimengungen oder Temperaturerhöhungen einhergehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Gegenanzeigen** sind keine bekannt.

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Alkohol- und Leberkranke sollten berücksichtigen, dass das Arzneimittel 69 Vol.-% Alkohol (Ethanol) enthält. Die Alkoholmenge entspricht pro Erwachsenenendosis etwa einem halben Teelöffel Wein.

**Wechselwirkungen** sind keine bekannt.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

**SANORELL PHARMA GmbH & Co KG** · D-72270 Baiersbronn-Obertal  
Hersteller: SANORELL PHARMA GmbH & Co KG · D-77815 Bühl/Baden · Hurststr. 31  
Telefon: (0 72 23) 93 37-0 · Telefax: (0 72 23) 93 37-50  
eMail: mail@sanorell.de · Internet: www.sanorell.de

**Hinweis**

Ungünstige Effekte von Okoubaka aubrevillei während der Schwangerschaft und Stillzeit sind nicht bekannt. Aus prinzipiellen Erwägungen sollten Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit jedoch nur aus wichtigen Gründen eingenommen werden.

**Nebenwirkungen**

sind bei der Anwendung von Okoubarell® bisher nicht bekannt geworden.

**Arzneimittelrechtlich vorgeschriebener Hinweis für alle homöopathischen Arzneimittel**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 5–10 Tropfen ein. Die Tropfen können unverdünnt oder auf einem Teelöffel mit Wasser verdünnt eingenommen und einige Zeit im Mund belassen werden, bevor sie geschluckt werden. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten.

**Packungsgröße**

Packung mit 50 ml flüssiger Verdünnung.

**Apothekenpflichtig**

