

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Ilio Funkton[®], Kautabletten



Wirkstoff: Simeticon 85 mg
entsprechend Dimeticon 80 mg

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Bewahren Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Ilio-Funkton[®] und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Ilio-Funkton[®] beachten?
3. Wie ist Ilio-Funkton[®] einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Ilio-Funkton[®] aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Ilio-Funkton[®] und wofür wird es angewendet?

Ilio-Funkton[®] ist ein Arzneimittel gegen Blähungen.

Bei übermäßiger Gasbildung und Gasansammlung im Magen-Darm-Bereich (Meteorismus, Flatulenz, Aerophagie, Roemheld-Syndrom); vor diagnostischen Untersuchungen im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten im Röntgenbild; bei verstärkter Gasbildung nach Operationen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Ilio-Funkton® beachten?

Ilio-Funkton® darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie allergisch gegen Simecton, Levomenthol oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile von Ilio-Funkton® sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Ilio-Funkton® einnehmen.

Einnahme von Ilio-Funkton® zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Ilio-Funkton® während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Ilio-Funkton® enthält Lactose und Sorbitol.

Bitte nehmen Sie Ilio-Funkton® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Ilio-Funkton® einzunehmen?

Nehmen Sie Ilio-Funkton® immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet nehmen Sie 1-2 Ilio-Funkton® Kautabletten zu oder nach den Mahlzeiten ein und zerkauen sie. Bei Bedarf können Sie auch vor dem Schlafengehen 1-2 Kautabletten einnehmen.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden. Ilio-Funkton® Kautabletten können, falls erforderlich über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Ilio-Funkton® eingenommen haben, als Sie sollten

Vergiftungen nach Einnahme von Ilio-Funkton® Kautabletten sind nicht bekannt.

Der Wirkstoff von Ilio-Funkton® bringt den Schaum im Magen-Darm-Kanal auf rein physikalischem Wege zur Auflösung und ist chemisch und biologisch vollkommen unwirksam. Deshalb ist eine Vergiftung ausgeschlossen. Auch große Mengen Ilio-Funkton® werden problemlos vertragen.

Wenn Sie die Einnahme von Ilio-Funkton® vergessen haben

In diesem Fall können Sie die Einnahme nachholen.

Wenn Sie die Einnahme von Ilio-Funkton® abbrechen

In diesem Fall kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es wurden bisher keine Nebenwirkungen beobachtet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Ilio-Funkton® aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Das Verfallsdatum ist auf der Durchdrückpackung und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

An die Aufbewahrung sind keine bestimmten Anforderungen zu stellen.

6. Weitere Informationen

Was Ilio-Funkton® enthält:

Der Wirkstoff ist: Simeticon.

1 Kautablette enthält 85 mg Simeticon, entsprechend 80 mg Dimeticon.

Die sonstigen Bestandteile sind: Sorbitol (Ph. Eur.), Lactose-Monohydrat, Mikrokristalline Cellulose, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat und Levomenthol.

Wie Ilio-Funkton® aussieht und Inhalt der Packung:

Ilio-Funkton® Kautabletten sind weiß und in Packungen zu 20 Kautabletten und 50 Kautabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Robugen GmbH Pharmazeutische Fabrik

Alleenstraße 22-26

73730 Esslingen

Tel.: 0711 / 136 30-0

Fax: 0711 / 36 74 50

Email: info@robugen.de

Internet: www.robugen.de



Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2017.