



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Aciclostad[®] gegen Lippenherpes

Wirkstoff: Aciclovir

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.

Sonstige Bestandteile: Cetylalkohol, Dimeticon350cSt, Poly(oxyethylen)-5-glyceroltri(palmitat/stearat), dickflüssiges Paraffin, Propylenglycol, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen zu 2 g Creme (N1)

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Aciclostad[®] gegen Lippenherpes ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Virusinfektionen (Virostatikum)

Pharmazeutischer Unternehmer: STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259, Internet: www.stada.de

Hersteller: STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Anwendungsgebiete

Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen mit Bläschenbildung im Lippenbereich (rezidivierender Herpes labialis).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Aciclostad[®] gegen Lippenherpes nicht anwenden?

Sie dürfen Aciclostad[®] gegen Lippenherpes nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Aciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile. Sie dürfen Aciclostad[®] gegen Lippenherpes nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle oder am Auge) auftragen, da sonst mit örtlichen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

Wann dürfen Sie Aciclostad[®] gegen Lippenherpes erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Aciclostad[®] gegen Lippenherpes nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungsbeginn darauf hinweisen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Cetylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Aciclostad[®] gegen Lippenherpes nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Aciclostad[®] gegen Lippenherpes sonst nicht richtig wirken kann!




Anforderungscoupon

Bitte schneiden Sie diesen Anforderungscoupon aus und senden Sie ihn an:

STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Ja, ich bin an weiteren kostenlosen Informationen zu Aciclostad[®] gegen Lippenherpes interessiert und erkläre mein Einverständnis, dass meine Daten zu weiteren Informationszwecken benutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.





In welcher Dosierung und wie oft sollten Sie Aciclostad® gegen Lippenherpes anwenden?

Sie sollten die Creme 5-mal täglich alle 4 Stunden auf die infizierten Hautbereiche dünn auftragen.

Wie und wann sollten Sie Aciclostad® gegen Lippenherpes anwenden?

Sie sollten Aciclostad® gegen Lippenherpes mittels eines Wattestäbchens auftragen, indem Sie dieses mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestreichen. Beim Auftragen sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedecken, sondern dass Sie auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbeziehen. Falls Sie das Auftragen mit der Hand vornehmen, sollten Sie diese vorher und nachher intensiv reinigen, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartie (z.B. durch Bakterien) bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und Hautbereiche zu verhindern.

Besonderer Hinweis:

Um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte Aciclostad® gegen Lippenherpes bereits bei den ersten Anzeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) angewendet werden.

Wie lange sollten Sie Aciclostad® gegen Lippenherpes anwenden?

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage. Im Einzelfall sollte eine Behandlung so lange erfolgen, bis die Bläschen verkrustet oder abgeheilt sind. Eine Behandlungsdauer von 10 Tagen sollte jedoch nicht überschritten werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Aciclostad® gegen Lippenherpes angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort (tragen Sie die Creme z.B. nicht häufiger oder dicker auf).

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden wollen?

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, Aciclostad® gegen Lippenherpes ausreichend lange anzuwenden (siehe auch „Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung“).

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Aciclostad® gegen Lippenherpes auftreten?

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Nach der Anwendung von Aciclostad® gegen Lippenherpes kann vorübergehendes Brennen oder Stechen auf den behandelten Hautabschnitten auftreten. Rötung, Eintrocknung und Abschuppung der mit Aciclostad® gegen Lippenherpes behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet.

Selten wurde nach Anwendung von Aciclostad® gegen Lippenherpes vom Auftreten einer allergischen Hautreaktion (Kontaktdermatitis) berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Creme-Grundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als Ursache der Hautreaktion.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die oben genannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen. In solchen Fällen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Tube und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Aciclostad® gegen Lippenherpes aufzubewahren?

Nicht über +25°C aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

9210293
0411



Stand der Information: 1. November 2004



Name: _____

PLZ/Ort: _____

Vorname: _____

E-Mail: _____

Straße: _____

Geburtsdatum: _____

