

BEAVITA

SÄTTIGUNGS

KAPSELN

Med



DE: BEAVITA

Sättigungskapseln

Medizinprodukt

- Zur Behandlung von Obesitas
- Verringert den Appetit und verhindert Überernährung
- Für substanzielles Gewichtsverlust

Allgemeine Empfehlungen: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor Sie BEAVITA Sättigungskapseln anwenden, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt bereits früher verwendet haben. Die Informationen können den neuesten Erkenntnissen und Daten angepasst sein, wenn Sie mit einer neuen Packung beginnen. Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei. Trotzdem müssen Sie BEAVITA Sättigungskapseln sorgfältig anwenden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diesen Anwendungsleitfaden gut auf, eventuell benötigen Sie ihn noch einmal.

Wann werden BEAVITA Sättigungskapseln eingesetzt?

BEAVITA Sättigungskapseln ist ein Medizinprodukt zur Unterstützung von Gewichtsverlust. Es ist für Erwachsene ab 18 Jahren geeignet, die mehr als 10 Kilo Übergewicht oder einen Body Mass Index (BMI) von 28 oder höher haben. Für ein gutes Ergebnis wird empfohlen, BEAVITA Sättigungskapseln in Kombination mit einer Diät mit verringriger Kalorien-Zuführung zu gebrauchen.

Mit dem BMI kann festgestellt werden, ob Sie ein gesundes Körpergewicht haben oder ob Sie im Verhältnis zu Ihrer Körpergröße zu schwer sind. Mit Hilfe folgender Tabelle können Sie feststellen, ob Sie übergewichtig sind. Suchen Sie in der Tabelle Ihre Körpergröße.

Wenn Sie weniger wiegen als das Gewicht zu Ihrer Körpergröße, brauchen Sie keine BEAVITA Sättigungskapseln.

Zusammensetzung: Das Produkt ist auf pflanzlicher Basis. Omtec19, Amylum Solani, Omtec20, Hypromellose (E464), Oleum Helianthus.

Das Produkt ist für Vegetarier geeignet.

Allergene: Dieses Produkt enthält keine Allergene.

Einnahme während der Schwangerschaft oder Stillzeit:

Bei Schwangerschaft oder Stillzeit wird davon abgeraten abzunehmen. Eventuelle Schadstoffe aus dem Fettgewebe können dann zum Kind gelangen. Daher wird in diesem Fall von der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln abgeraten.

Einnahme in Kombination mit Medikamenten: BEAVITA Sättigungskapseln senken den Glukosespiegel im Blut.

Wenn Sie unter Diabetes leiden, ist es wichtig, den Blutzuckerspiegel gut zu beobachten. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt, möglicherweise muss Ihre Medikation gegen Diabetes angepasst werden.

Von der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln in Kombination mit anderen Diät-Ergänzungsmitteln oder Medikamenten mit hypoglykämischen Effekt ohne Rücksprache mit Arzt oder Apotheker wird abgeraten.

BEAVITA Sättigungskapseln verlangsamen das Tempo der Speisenaufnahme und dies kann theoretisch auch auf Medikamente wirken. Orale Medikamente müssen 1 Stunde vor oder 4 Stunden nach der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln eingenommen werden. Wenn Sie Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie mit der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln beginnen.

Multivitamine und BEAVITA Sättigungskapseln: Während des Abnehmens und der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln müssen Sie jeden Tag ein Multivitamin- und Mineralienpräparat einnehmen. BEAVITA Sättigungskapseln verringern die Aufnahme bestimmter Vitamine und Mineralien im Körper. Nehmen Sie das Vitamin- und Mineralienpräparat am besten vor dem Schlafengehen ein, um sicher zu sein, dass die Vitamine und Mineralien aufgenommen werden.

⚠ Warnhinweise:

- BEAVITA Sättigungskapseln dürfen nicht eingenommen werden bei:

- Unverträglichkeit eines oder mehrerer Bestandteile
- Gastrointestinalen Störungen
- Speiseröhrenverengung oder bereits bestehenden Darmabweichungen
- Schwangerschaft oder Stillzeit

- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie BEAVITA Sättigungskapseln alleine oder in Kombination mit anderen Medikamenten anwenden dürfen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

- Achtung! Kapsel vor Einnahme nicht öffnen.

- Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.

Mögliche Nebenwirkungen:

BEAVITA Sättigungskapseln sind gut verträglich, kann bei einigen Menschen aber Nebenwirkungen verursachen. Zu Beginn können leichte Magen-Darm-Beschwerden auftreten wie dünne Stühle, leichter Durchfall, saures Aufstoßen, Flatulenz oder Verstopfung. Meistens verschwinden diese Nebenwirkungen nach ein paar Tagen. Um sie zu vermeiden, kann man mit einer niedrigeren Dosis beginnen (1 Kapsel pro Mahlzeit), um sie dann allmählich zu steigern, je nachdem, wie sich der Körper der Dosierung angepasst hat. Wenn eine der Nebenwirkungen ernsthaft wird oder wenn bei Ihnen eine Nebenwirkung auftritt, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung steht, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

⚠ Lagerung:

Bei Zimmertemperatur (5-25°C) an einem trockenen, dunklen Platz in Originalverpackung aufbewahren, außerhalb der Reichweite von Kindern.

LOT

Verwendbar bis:

Von der Einnahme von BEAVITA Sättigungskapseln nach dem auf der Verpackung angegebenen Datum wird abgeraten.

MD

Medizinprodukt: BEAVITA Sättigungskapseln ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa, der Richtlinie 93/42/EWG

Hersteller: PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, Niederlande

Vertrieb: nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Deutschland

Datum der letzten Überarbeitung dieser Gebrauchsanweisung: November 2022

Composition : Le produit est basé sur des ingrédients végétaux : Omtec19, Amylum Solani, Omtec20, Hypromellose (E464), Oleum Helianthus.

Le produit est adapté aux végétariens et végétaliens.

Allergènes : Le produit ne contient aucun allergène.

Utilisation pendant la grossesse et/ou l'allaitement : Il n'est pas recommandé de maigrir pendant la grossesse ou l'allaitement, car d'éventuelles substances nuisibles provenant du tissu graisseux peuvent atteindre l'enfant. Par conséquent, l'utilisation de BEAVITA gélules de satiété est déconseillée.

Utilisation en combinaison avec des médicaments : BEAVITA gélules de satiété réduisent le taux de glycémie.

Si vous souffrez de diabète, il est important de bien contrôler votre taux de glycémie. Consultez dans ce cas votre médecin, car il se peut que votre médication contre le diabète doive être adaptée.

L'utilisation de BEAVITA gélules de satiété en combinaison avec d'autres suppléments / médicaments diététiques ayant un effet hypoglycémique similaire est donc déconseillée sans avoir préalablement demandé conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

BEAVITA gélules de satiété ralentissent le rythme avec lequel les aliments sont absorbés et en théorie, il peut en être de même pour les médicaments. Les médicaments à prendre oralement doivent être pris 1 heure avant ou 4 heures après l'utilisation de BEAVITA gélules de satiété. Consultez votre médecin ou votre pharmacien lorsque vous prenez des médicaments avant de commencer à utiliser BEAVITA gélules de satiété.

Multivitamines et BEAVITA gélules de satiété : Pendant la perte de poids et l'utilisation de BEAVITA gélules de satiété, il est recommandé de prendre chaque jour un complexe de vitamines et de minéraux. BEAVITA gélules de satiété peut en effet réduire l'assimilation de certaines vitamines et certains minéraux dans le corps.

Prenez ce complexe de vitamines et minéraux de préférence avant d'aller vous coucher, pour être certain que les vitamines et minéraux seront assimilés.

⚠ Avertissements :

- BEAVITA gélules de satiété ne doit pas être utilisé en cas de :

- hypersensibilité à un ou plusieurs des composants,
- troubles gastro-intestinaux,
- sténose de l'œsophage ou anomalies de l'intestin déjà existantes,
- grossesse ou allaitement.

- En cas de doute quant à savoir si vous pouvez utiliser BEAVITA gélules de satiété et/ou l'utiliser en combinaison avec un médicament, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

- Attention ! Ne pas ouvrir la capsule avant son absorption.

- Garder hors de portée des jeunes enfants.

Besoeken indésirables éventuels :

BEAVITA gélules de satiété est bien supporté, mais il peut provoquer certains effets indésirables, chez certaines personnes seulement. Au début, de légers troubles gastriques et intestinaux peuvent se produire, comme des selles molles, une légère diarrhée, des renvois et des gaz ou de la constipation. Généralement, ces effets indésirables disparaissent après quelques jours. Pour éviter des effets indésirables, il est possible de commencer avec un faible dosage (1 capsule par repas), après quoi vous pouvez progressivement augmenter le dosage, au fur et à mesure que le corps s'est habitué au dosage. Lorsqu'un des effets indésirables est important ou lorsque survient chez vous un effet indésirable qui ne figure pas dans le mode d'emploi survient, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

⚠ Mode de conservation :

Conserver à température ambiante (5-25°C) dans un endroit sec et sombre, dans l'emballage d'origine et hors de portée des enfants.

LOT

Date limite d'utilisation :

L'utilisation de BEAVITA gélules de satiété après la date indiquée sur l'emballage après la mention 'à consommer avant le' est déconseillée.

MD

Dispositif médical :

BEAVITA gélules de satiété est un dispositif médi-cal de classe IIa conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.

Fabricant :

PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406

XP Uden, Pays-Bas

Distribution : nu3 GmbH, Brückenstr. 5,

10179 Berlin, Allemagne

Date de la dernière révision de ces instructions d'utilisation : Novembre 2022

Composizione: il prodotto è a base vegetale. Omtec19, Amylum Solani, Omtec20, Hypromellose (E464), Oleum Helianthus.

Il prodotto è adatto ai vegetariani.

Allergeni: il presente prodotto non contiene allergeni.

Utilizzo durante la gravidanza o l'allattamento: si consiglia l'assunzione durante la gravidanza o l'allattamento. Eventuali sostanze nocive provenienti dal tessuto adiposo possono raggiungere il bambino, non è pertanto consigliabile assumere BEAVITA Capsule della sazietà in questo caso.

Utilizzo in combinazione di farmaci: BEAVITA Capsule della sazietà abbassa il livello di glucosio nel sangue. Se si soffre di diabete, è importante tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue. In questo caso, consultare il medico, potrebbe essere necessario adattare i farmaci per il diabete.

Non è consigliabile assumere BEAVITA Capsule della sazietà in combinazione con altri integratori alimentari o farmaci con effetto ipoglicemizzante senza consultare il medico o il farmacista.

BEAVITA Capsule della sazietà rallenta l'assunzione di cibo influendo teoricamente anche sui farmaci. I farmaci per via orale devono essere assunti 1 ora prima o 4 ore dopo l'assunzione di BEAVITA Capsule della sazietà. In caso di assunzione di farmaci, consultare il medico o il farmacista prima di iniziare BEAVITA Capsule della sazietà.

Multivitamine e BEAVITA Capsule della sazietà:

Durante la perdita di peso e l'assunzione di BEAVITA Capsule della sazietà, è necessario assumere ogni giorno un integratore multivitamino e minerale. BEAVITA Capsule della sazietà riduce l'assorbimento di alcune vitamine e minerali nell'organismo. Si consiglia di assumere l'integratore vitamínico e minerale prima di andare a letto, per essere sicuri che le vitamine e i minerali vengano assorbiti.

⚠ Avvertenze:

- BEAVITA Capsule della sazietà non deve essere assunta in caso di:

- intolleranza a uno o più componenti
- disturbi gastrointestinali
- stenosi esofagea o anomalie intestinali preesistenti
- gravidanza o allattamento

- Se non si è sicuri di poter assumere BEAVITA Capsule della sazietà da solo o in combinazione con altri farmaci, chiedere al medico o al farmacista.

- Attenzione! Non aprire la capsula prima dell'assunzione.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Possibili effetti collaterali:

BEAVITA Capsule della sazietà è ben tollerato, ma può causare effetti collaterali in alcune persone. Possono verificarsi inizialmente lievi disturbi gastrintestinali come feci sottili, lieve diarrea, rigurgito acido, flatulenza o costipazione. Nella maggior parte dei casi, questi effetti collaterali scompaiono dopo pochi giorni. Per evitarli, si può iniziare con una dose inferiore (1 capsula per pasto) e poi aumentarla gradualmente man mano che l'organismo si adatta al dosaggio. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati diventa grave o se si verifica un effetto indesiderato non previsto dalle presenti istruzioni per l'uso, contattare il medico o il farmacista.

⚠ Stoccaggio:

conservare a temperatura ambiente (5-25°C) in un luogo asciutto e buio, nella confezione originale, fuori dalla portata dei bambini.

LOT

Scadenza: non si consiglia di assumere BEAVITA Capsule della sazietà oltre la data indicata sulla confezione.

MD

Dispositivo medico:

BEAVITA Capsule della sazietà è un dispositivo medico di classe IIa, secondo la direttiva 93/42/CEE.

Fabbricante:

PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406

XP Uden, Paesi Bassi

Distribuzione: nu3 GmbH, Brückenstr. 5,

10179 Berlin, Germania

Ultima modifica delle presenti istruzioni per l'uso: Novembre 2022

Samenstellung: Het product is gebaseerd op plantaardige ingrediënten: Omtec19, Amylum Solani, Omtec20, Hypromellose (E464), Oleum Helianthus.

Het product is geschikt voor vegetariërs.

Allergenen: Dit product bevat geen allergenen.

Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding: Bij zwangerschap of borstvoeding wordt afgeraden af te vallen, mogelijke schadelijke stoffen uit het vetweefsel kunnen dan bij het kind terechtkomen. Het gebruik van de BEAVITA Verzadigingscapsules wordt daarom afgeraden.

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen: BEAVITA Verzadigingscapsules verlaagt de glucosepiegel van het bloed.

Als u lijdt aan diabetes is het belangrijk om uw bloedsuikerpiegel goed te monitoren. Overleg in dit geval met uw arts, want mogelijk moet uw medicatie tegen diabetes worden aangepast. Gebruik van BEAVITA Verzadigingscapsules in combinatie met andere dieet supplementen of geneesmiddelen, die een hypoglykemisch effect hebben, wordt afgeraden wanneer er vooraf geen overleg met arts of apotheker is gepleegd.

BEAVITA Verzadigingscapsules verlaagt het tempo waarop voedsel wordt geabsorbeerd en theoretisch kan dit dus ook met geneesmiddelen gebeuren. Orale medicijnen moeten 1 uur voor of 4 uur na gebruik van BEAVITA Verzadigingscapsules worden ingenomen. Overleg met uw arts of apotheker wanneer geneesmiddelen gebruikt worden, voordat u BEAVITA Verzadigingscapsules gaat gebruiken.

Multivitamines en BEAVITA Verzadigingscapsules: Tijdens het afvallen en het gebruik van BEAVITA Verzadigingscapsules moet u iedere dag een multivitamine en mineralenpreparaat innemen.

BEAVITA Verzadigingscapsules kan de opname van bepaalde vitamines en mineralen in het lichaam verminderen. Neem het vitamine- en mineralenpreparaat bij voorkeur voor het slapengaan, om er zeker van te zijn dat de vitamines en mineralen geabsorbeerd worden.

⚠ Waarschuwingen:

- BEAVITA Verzadigingscapsules dient niet te worden gebruikt bij:

- overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen;
- gastro-intestinale stoornissen;
- slakdarm stenose of reeds bestaande darm afwijkingen;
- zwangerschap of borstvoeding;

- Bij twijfel of u BEAVITA Verzadigingscapsules mag gebruiken en/of in combinatie met een geneesmiddel mag gebruikten raadpleeg dan uw arts of apotheker;

- Let op! Capsule niet openen voor inname;

- Buitenveld bereik van jonge kinderen.

Mogelijke bijwerkingen:

BEAVITA Verzadigingscapsules wordt goed verdragen, maar kan enkele bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. In het begin kunnen milde maag- en darmklachten optreden zoals dunne of losse ontlasting, lichte diarree, oprispingen en gasvorming of constipatie. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na een aantal dagen. Om deze bijwerkingen te vermijden kan met een lage dosering worden gestart (1 capsule per maaltijd), waarna de dosering geleidelijk wordt verhoogd, naarmate het lichaam zich aan de dosering heeft aangepast. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij een bijwerking optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

⚠ Wijze van bewaren:

Bij (5-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het bereik van kinderen.

⚠ Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik van BEAVITA Verzadigingscapsules na de datum op de verpakking achter niet gebruiken na wordt afgeraden.

MD

Medisch hulpmiddel:

BEAVITA Verzadigingscapsules is een medisch hulpmiddel klasse IIa conform de medische hulpmiddel richtlijn 93/42/EEC.

Fabrikant:

PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406

XP Uden, Nederland

Distributie: nu3 GmbH, Brückenstr. 5, 10179 Berlin, Duitsland

Datum van de meeste recente herziening van deze gebruiksaanwijzing: November 2022