



Ch.-B.:  
Verwendbar bis:



**Zusammensetzung:**

100 g Zinköl enthalten:  
Wirkstoff: 50 g Zinkoxid  
Sonstige Bestandteile: 50 g Olivenöl  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder  
aufbewahren!  
Nach Ablauf des Verfalldatums  
nicht mehr anwenden.

**Vor Gebrauch schütteln.**

**PZN 09234521**

**Art.-Nr. 7891**

**Zul.-Nr. 7599.99.99**

**Caesar & Loretz GmbH**  
**Herderstraße 31, D-40721 Hilden**  
**www.caelo.de**



Suspension zum  
Auftragen auf die Haut

Apothekenpflichtig

●●● 120 g N2

**Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Wundbehandlungsmittel

**Anwendungsgebiete:**

Zur Abdeckung der Haut von Wundrändern (Ulcera, Erosionen).  
Bei Reizungen und Rötungen der Haut im intertrigenösen Bereich  
(Hautfalten), im Windelbereich und am Übergangsbereich  
Haut/Schleimhaut (Mund, After, Genitalien). Bei Fissuren und  
Rhagaden.

**Nebenwirkungen:**

Nach Auftragen von Zinköl auf stark entzündliche Hautpartien  
kann ein leichtes Brennen auftreten. Verschlechterung der  
Heilung durch Sekret- und Wärmestau. Hinweis: Wenn Sie  
Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt  
oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht auf

dieser Packung angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen  
auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-  
produkte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,  
D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie  
Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr  
Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Ver-  
fügung gestellt werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Vor der Anwendung anderer Externa ist Zinköl vollständig  
zu entfernen (eingeschränkte Wirkung weiterer Externa).

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, wird Zinköl ein- bis mehrmals  
täglich auf die betroffenen Hautflächen aufgetragen.

Stand der Information: September 2020

V7891ET 0521

