BARYOSAN

Allgemeine Infos

Indikation
Arteriosklerose; Bluthochdruck; Schwindel unterschiedlicher Ursache; Migräne

Gegenanzeigen
Jodüberempfindlichkeit. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne medizinischen Rat anwenden. Dieses Arzneimittel enthält Lactose, daher ist es ungeeignet für Patienten, die an einer Lactoseunverträglichkeit leiden.

Nebenwirkungen
Bei Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und einen hmöopathisch erfahrenen Arzt oder Therapeuten befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht hier aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Therapeuten oder Apotheker mit.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln
Nicht bekannt. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Therapeuten.

Dosierungsanleitung
Soweit nicht anders verordnet, 1-3mal täglich 1 Tablette vor oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen, dabei mögichst im Munde zergehen lassen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Dauer der Anwendung
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Inhaltsstoffe
1 Tablette enthält:

Wirksame Bestandteile	*Potenz*	*Menge*	*Arzneimittelbilder(Auszug)*
Arnica montana	Trit. D 2	4,0 mg	Blutungen aller Art; Myalgie nach Überlastung; Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems
Aurum chloratum	Trit. D 2	0,4 mg	Angina pectoris, Herzvergrößerung; Gebärmutterblutung, Gebärmutterverhärtungen; Verhärtung der Zunge
Barium carbonicum	Trit. D 4	4,0 mg	Entwicklungsverzögerung bei Kindern; chronische Entzündung der Mandeln und der oberen Atemwege; Bluthochdruck, Gefäßverkalkung
Barium iodatum	Trit. D 4	4,0 mg	Vergrößerung und Verhärtung drüsiger Organe; Kropfleiden; Bluthochdruck und Gehirngefäßverkalkung
Kalium iodatum	Trit. D 1	0,4 mg	Entzündungserscheinungen der oberen Luftwege; Weichteilrheumatismus
Plumbum aceticum	Trit. D 4	4,0 mg	Nervenschmerzen in gelähmten Gliedern; Mumps
Secale cornutum	Trit. D 2	4,0 mg	Gebärmutterkrämpfe, Muskelkrämpfe, Krampfleiden, Lähmungen, Durchblutungsstörungen bei Schlagaderkrankheiten, Blutungsneigung

Anmerkungen
Bei Bluthochdrucktherapie tritt die Wirkung nach etwa 3 bis 6 Wochen ein.

Handelsformen

Darreichungsform	*Packungsgröße*
Tabletten	OP 100 Tabletten

HANOSAN GmbH
Hanosanstraße 1 · 30826 Garbsen
Tel.: 05131/4593-0 · Fax: 05131/4593-45
info@hanosan.de · www.hanosan.de

PZN
100 St. 9268218

HANOSAN GmbH
Hanosanstraße 1 · 30826 Garbsen
Tel.: 05131/4593-0 · Fax: 05131/4593-45
info@hanosan.de · www.hanosan.de