

PACT® UREA 40

Nagelreparatur

Gebrauchsanweisung PACT® UREA 40

Inhalt: PACT® UREA 40 Salbe 10g,
Pflaster 5m, Nagelfeile grob

10 g Salbe, INCI: UREA (40 %), PETROLATUM
(VASELINE), LANOLIN ALKOHOL, GLYCEROL,
PIROCTONE OLAMINE




Zur Reduktion von Nagelverfärbungen und zur Auflösung von brüchigem Nagelmateriale zum Beispiel durch Nagelpilzinfektionen.

PACT® UREA 40 enthält Harnstoff (ca. 40 %). PACT® UREA 40 kann den brüchigen (oder pilzbe-fallenen) Teil des Nagels auflösen. Der beschädigte Teil des Nagels kann abgelöst und vorsichtig abge-schnitten oder mit einer Nagelfeile entfernt werden.

Anwendung:

- Rauen Sie mit der Nagelfeile den betroffenen Nagel an den beschädigten oder von Pilzen befallenen Stellen gründlich auf und entfernen Sie das Nagel-material mit Hilfe einer Nagelschere.



- Tragen Sie nun die Salbe einmal täglich, möglichst nach dem Duschen, großzügig auf den betroffenen Nagel auf, sodass die gesamte Nagelfläche, auch die gesunde, bedeckt ist. Decken Sie den so be-handelten Nagel für 24 Stunden mit einem Pflaster (Verband) ab. Dazu reißen Sie die erforderliche Menge von dem Pflasterband ab, ggf. verwenden Sie 2 Stück Pflaster.
- Wiederholen Sie die Behandlung mit der Salbe täglich, entfernen Sie zuvor überschüssige Salben-reste von der letzten Anwendung. Verwenden Sie zur Ablösung des beschädigten Nagelteils auch die beigelegte Nagelfeile oder eine Nagelschere. Je nach Ausmaß der Beschädigung (Verpilzung) und der Dicke des Nagels ist diese Behandlung 2 bis 3 Wochen lang erforderlich.

- Nach dieser 2-bis 3-wöchigen Behandlung sollte der beschädigte Teil abgelöst sein. Falls erforderlich, kann das nun erweichte Nagelmateriale auch von einer Fachkraft (medizinische Fußpflege) entfernt werden.

- Der Nagel ist nun weich und geschmeidig und kann gesund nachwachsen. Die PACT® UREA 40 Salbe sollte nun täglich ohne Pflaster aufgetragen werden, um den Nagel weich zu halten, bis er vollständig nachgewachsen ist (Dauer: 3-6 Monate).

Bei schwerem Nagelpilzbefall (mehr als 1/3 des Nagels befallen, Befall nahe dem körpernahen Nagelfalz, mehr als 3 Zehen befallen) wird eine zusätzliche photodynamische Behandlung mit PACT® MED durch eine medizinische Fußpflege-Fachkraft empfohlen (Fußpfleger/in, Podologe/in), siehe www.cumdente.com.

Wann soll PACT® UREA 40 nicht angewendet werden?

Bei Überempfindlichkeiten (Allergie) gegen einen der Bestandteile der Salbe oder gegen das Pflaster. Nicht verschlucken, nicht auf geschädigter Haut anwenden. Waschen Sie nach der Anwendung Ihre Hände. Nicht in Augennähe oder auf Schleimhäute auftragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei manchen Patienten kann PACT® UREA 40 unerwünschte Nebenwirkungen verursachen: Hautrötung, Hautreizung, feuchtes Aufweichen der Haut, Lösen von kleinen Schuppen von der Hautoberfläche (Desquamation). Jede sonstige unerwünschte Nebenwirkung ist dem Hersteller zu melden. Besondere Vorsichtsmaßnahme für die Aufbewahrung: Nicht über 30°C lagern.

Hersteller:

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany
www.cumdente.com

Vertrieb:

Hahn Medical GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany
www.hahnmedical.de

PACT® UREA 40

Nail Repair

Instructions for use PACT® UREA 40

Content: PACT® UREA 40 ointment 10g,
Plaster 5m, nail file (rough)

Ingredients: 10 g Ointment, INCI: UREA (40 %),
PETROLATUM (VASELINE), LANOLIN ALKOHOL,
GLYCEROL, PIROCTONE OLAMINE



To reduce nail discolourations and to dissolve brittle nail material, for example due to nail fungus infections.

PACT® UREA 40 contains urea (approx. 40 %). PACT® UREA 40 can dissolve the brittle (or fungal infected) part of the nail. The damaged part of the nail can be detached and cautiously cut off or removed with a nail file.

Application:

- Thoroughly roughen the affected nail with the nail file where there is damage or places infected with fungus and remove the nail material with the help of nail scissors.



- Now apply the ointment generously once a day, preferably after showering, on the affected nail such that the entire nail surface, including the healthy surface, is covered. Cover the nail treated this way with a plaster (dressing) for 24 hours. Then tear off the required amount from the plaster tape. If necessary use two pieces of plaster.
- Repeat the treatment with the ointment every day after removing the remaining ointment from the last application. Use the nail file provided or nail scissors to detach the damaged part of nail. Depending on the scale of damage (fungus infection) and the thickness of the nail, this treatment takes 2 to 3 weeks.
- After this 2-3 week treatment, the damaged part of the nail should be detached, the softened nail material can also be removed by a specialist (pedicurist).

- The nail is now soft and supple and can regrow healthily. The PACT® UREA 40 ointment should now be applied daily without a plaster to keep the nail soft until it is fully regrown (duration: 3-6 months).

In case of severe nail fungus infection (more than 1/3 of the nail infected, infection almost up to proximal (to the body) nail fold, more than three toes infected), an additional photo-dynamic treatment with PACT® MED by a specialist is recommended (pedicurist, podiatrist), see www.cumdente.com.

When should PACT® UREA 40 not be used?

In case of hypersensitivity (allergy) against one of the ingredients of the ointment or against the plaster. Do not swallow, do not use on damaged skin. Wash your hands after use. Do not apply close to the eyes or on mucous tissue. Keep out of reach of children.

What side effects are possible?

PACT® UREA 40 may cause side effects in some patients: redness of the skin, skin irritation, moist softening of the skin, desquamation (flaking off of small skin cells from the skin surface).

Every other side effect should be reported to the manufacturer. Special precaution for storage: Do not store above 30°C.

Manufacturer:

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany
www.cumdente.com

Distributor:

Hahn Medical GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany
www.hahnmedical.com