



# ISOPROPANOL 70 % (V/V)

Desinfektionsmittel

## **Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Desinfektionsmittel

## **Anwendungsgebiete:**

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

## **Gegenanzeigen:**

Isopropanol 70 % (V/V) ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

## **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt.

## **Warnhinweise:**

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten!

Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

## **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.

Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

## **Hinweise:**

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern.

Isopropanol 70 % (V/V) wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

**Nebenwirkungen:**

Beim Einreiben der Haut mit Isopropanol 70 % (V/V) können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise:**

Dicht verschlossen aufbewahren.  
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

**Zusammensetzung:**

100 g Caelo Isopropanol 70 % (V/V) enthalten:  
Wirksamer Bestandteil: 63,1 g 2-Propanol  
Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser

**Darreichungsform und Inhalt:**

100 ml Lösung

**Pharmazeutisches Unternehmen:**

Caesar & Loretz GmbH  
Herderstraße 31, D-40721 Hilden  
[www.caelo.de](http://www.caelo.de)

Stand der Information: November 2019