PHYLAK® SPAGYRIK

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation

Primula veris

spag. Zimpel Ø
nach HAB-Vorschrift 26
Ch.-B.: 2207008.12
50 ml (N1) Urtinktur
zum Einnehmen
verw. bis: 09.2025

PHYLAK Sachsen® GmbH
Neustädter Str. 9, 02979 Spreetal
www.phylak.de

Apothekenpflichtig

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.
Nebenwirkungen, Gegenanzeigen, Wechselwirkungen: keine bekannt.
Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Dieses Arzneimittel enthält maximal 9 mg Alkohol (Ethanol) pro Tropfen. Die Menge in 1 ml (26 Tropfen) dieses Arzneimittels entspricht weniger als 6 ml Bier oder 3 ml Wein.
Der Alkohol in diesem Arzneimittel hat wahrscheinlich Auswirkungen auf Kinder. Dazu gehören Schläfrigkeit und Verhaltensänderungen. Es kann auch zu Beeinträchtigungen der Konzentrationsfähigkeit und der Fähigkeit zur Teilnahme an körperlichen Aktivitäten kommen.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen, wenn Sie schwanger sind oder stillen, Sie andere Arzneimittel einnehmen, Sie Epilepsie oder Leberprobleme haben oder Sie alkoholabhängig sind.
Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel verändern.

PHYLAK® SPAGYRIK

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation

Primula veris

spag. Zimpel Ø
nach HAB-Vorschrift 26
Ch.-B.: 2207008.14
100 ml (N2) Urtinktur
zum Einnehmen
verw. bis: 09.2025

PHYLAK Sachsen® GmbH
Neustädter Str. 9, 02979 Spreetal
www.phylak.de

Apothekenpflichtig

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.
Nebenwirkungen, Gegenanzeigen, Wechselwirkungen: keine bekannt.
Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Dieses Arzneimittel enthält maximal 9 mg Alkohol (Ethanol) pro Tropfen. Die Menge in 1 ml (26 Tropfen) dieses Arzneimittels entspricht weniger als 6 ml Bier oder 3 ml Wein.
Der Alkohol in diesem Arzneimittel hat wahrscheinlich Auswirkungen auf Kinder. Dazu gehören Schläfrigkeit und Verhaltensänderungen. Es kann auch zu Beeinträchtigungen der Konzentrationsfähigkeit und der Fähigkeit zur Teilnahme an körperlichen Aktivitäten kommen.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen, wenn Sie schwanger sind oder stillen, Sie andere Arzneimittel einnehmen, Sie Epilepsie oder Leberprobleme haben oder Sie alkoholabhängig sind.
Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel verändern.

PHYLAK® SPAGYRIK

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation

Primula veris

spag. Zimpel Ø
nach HAB-Vorschrift 26
Ch.-B.: 2207008.17
250 ml Urtinktur
zum Einnehmen
verw. bis: 09.2025

PHYLAK Sachsen® GmbH
Neustädter Str. 9, 02979 Spreetal
www.phylak.de

Apothekenpflichtig

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.
Nebenwirkungen, Gegenanzeigen, Wechselwirkungen: keine bekannt.
Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.
Dieses Arzneimittel enthält maximal 9 mg Alkohol (Ethanol) pro Tropfen. Die Menge in 1 ml (26 Tropfen) dieses Arzneimittels entspricht weniger als 6 ml Bier oder 3 ml Wein.
Der Alkohol in diesem Arzneimittel hat wahrscheinlich Auswirkungen auf Kinder. Dazu gehören Schläfrigkeit und Verhaltensänderungen. Es kann auch zu Beeinträchtigungen der Konzentrationsfähigkeit und der Fähigkeit zur Teilnahme an körperlichen Aktivitäten kommen.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen, wenn Sie schwanger sind oder stillen, Sie andere Arzneimittel einnehmen, Sie Epilepsie oder Leberprobleme haben oder Sie alkoholabhängig sind.
Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel verändern.