

Zur Unterstützung des Gelenkstoffwechsels bei Osteoarthritis

Mit Glucosaminoglycanen

CanIGum® Artrin ist besonders geeignet

- für ältere Tiere mit Verschleißerscheinungen an Knorpel, Sehnen und Bändern
- für Tiere im Wachstum
- bei starken Belastungen wie Wettkämpfen

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:

Mindestgehalt in der Trockenmasse an Omega-3-Fettsäuren insgesamt 3,3 % und an Eicosapentaensäure [EPA] 0,38 %. Angemessener Vitamin-E-Gehalt.

Zusammensetzung:

Fleisch und tierische Nebenprodukte, Glycerin, Propylenglycol, Fischöl, Glucosamin 6,2%, Reisstärke, Chondroitinsulfat 4,5%, Natriumchlorid

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	24,8 %
Rohöle u. -fette	14,8 %
Rohfaser	0 %
Rohasche	14,9 %
Feuchtigkeit	21,8 %
Omega-3-Fettsäuren	4,5 %
Docosahexaensäure [DHA]	3,8 %
Eicosapentaensäure [EPA]	0,4 %

Zusatzstoffe pro 1000 g:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat	7.500 mg
Zink als Glycin-Zinkchelate, Hydrat	2.870 mg
Vitamin E / all rac-alpha-Tocopheryllacetat	800 mg

Lecithine	58.000 mg
Kieselsäure, gefällt und getrocknet	38.500 mg
Weidenrindenextrakt	20.000 mg
Teufelskrallenextrakt	12.500 mg
Konservierungsmittel, Antioxidationsmittel	



i

Die **Glucosaminoglycane Chondroitinsulfat** und **Glucosamin** (GAG's) sind wichtige Knorpelbaustoffe, die für Wasserbindungsvermögen und Elastizität benötigt werden.

Omega-3-Fettsäuren können den Gelenkstoffwechsel bei Osteoarthritis in positiver Weise beeinflussen.

Zusätzlich sind **Teufelskrallenextrakt** und **Weidenrindenextrakt** enthalten.

Fütterungsempfehlung:

Zur täglichen Verabreichung.

Bei einem Gewicht

bis	10 kg	2 g [½ Portion]
von	> 10 kg – 20 kg	4 g [1 Portion]
von	> 20 kg – 30 kg	6 g [1 ½ Portionen]
von	> 30 kg – 40 kg	8 g [2 Portionen]

Ein Riegel (à 28 g) kann an den Bruchrillen in sieben Portionen à 4 g aufgeteilt werden.

Das Produkt ist sehr schmackhaft und kann auch zur Tabletteneingabe verwendet werden.

Empfohlene Fütterungsdauer:

Zunächst bis zu 3 Monate. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder der Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Spurenelementen nur an Hunde bis zu 2% der Tagesration verfüttert werden.

Nicht über 25°C und trocken lagern.

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform:

28 g [1 Kauriegel]

168 g [6 Kauriegel à 28 g]