Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL[®] 200 mg/245 mg Filmtabletten

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

- Was ist Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL und wofür wird es angewendet?
- Was sollten Sie vor der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL beachten?
- Wie ist Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL einzunehmen?
- Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- Wie ist Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL aufzubewahren?
- Inhalt der Packung und weitere Informationen

1 Was ist Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL und wofür wird es angewendet?

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: *Emtricitabin* und *Tenofovirdisoproxil*. Beide Wirkstoffe sind *antiretrovirale* Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein *Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer* und Tenofovir ein *Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer*. Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.

- Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL wird zur Behandlung einer Infektion mit dem Humanen Immundefizienz-Virus 1 (HIV-1) bei Erwachsenen angewendet.**
- Darüber hinaus wird es zur Behandlung von HIV bei Jugendlichen im Alter von 12 bis unter 18 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 35 kg angewendet**, die bereits mit anderen HIV-Arzneimitteln behandelt wurden und bei denen diese Arzneimittel nicht mehr wirksam sind oder Nebenwirkungen hervorgerufen haben.
- Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL muss stets in Kombination mit anderen Arzneimitteln zur Behandlung einer HIV-Infektion angewendet werden.
- Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL kann anstelle von Einzelpräparaten mit Emtricitabin und Tenofovirdisoproxil in identischer Dosis angewendet werden.

Personen, die HIV-positiv sind, können HIV auf andere übertragen, auch während der Einnahme dieses Arzneimittels, obwohl das Risiko durch eine effektive antiretrovirale Therapie verringert ist. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Vorsichtsmaßnahmen, die notwendig sind, um die Infizierung anderer Menschen zu verhindern.

Dieses Arzneimittel ist kein Heilmittel für eine HIV-Infektion. Sie können während der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL trotzdem Infektionen oder andere mit HIV einhergehende Erkrankungen bekommen.

- Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL wird auch angewendet, um das Risiko einer Ansteckung mit HIV-1 bei Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 12 bis unter 18 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 35 kg zu verringern. Hierfür wird es täglich eingenommen** und zusammen mit Safer-Sex-Praktiken angewendet. Im Abschnitt 2 finden Sie eine Liste mit Vorsichtsmaßnahmen gegen eine HIV-Infektion.

2 Was sollten Sie vor der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL beachten?

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL darf nicht zur Behandlung von HIV oder um das Risiko einer Ansteckung mit HIV zu verringern eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen Emtricitabin, Tenofovir, Tenofovirdisoproxil oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

→ **Bitte informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, falls dies auf Sie zutrifft.**

Bevor Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL einnehmen, um das Risiko einer Ansteckung mit HIV zu verringern: Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL kann nur dann helfen, das Risiko einer Ansteckung mit HIV zu verringern, **bevor** Sie infiziert werden.

- Sie müssen vor Beginn einer Behandlung mit Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL mit dem Ziel, das Risiko einer Ansteckung mit HIV zu verringern, HIV-negativ sein.** Sie müssen sich einem Test unterziehen, um sicherzustellen, dass Sie nicht schon eine HIV-Infektion haben. Sie dürfen Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL nur dann zur Verringerung Ihres Ansteckungsrisikos anwenden, wenn bestätigt ist, dass Sie HIV-negativ sind. Personen, die bereits HIV haben, müssen Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL in Kombination mit anderen Arzneimitteln einnehmen.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Mit vielen HIV-Tests kann eine vor kurzem erfolgte Ansteckung nicht nachgewiesen werden. Falls Sie grippeähnliche Beschwerden bekommen, könnte dies bedeuten, dass Sie sich vor kurzem mit HIV angesteckt haben. Folgende Beschwerden könnten Anzeichen einer HIV–Infektion sein: <ul style="list-style-type: none">Müdigkeit Fieber Gelenk- oder Muskelschmerzen Kopfschmerzen Erbrechen oder Durchfall Ausschlag Nachtschweiß vergrößerte Lymphknoten im Bereich von Hals oder Leiste
→ Informieren Sie Ihren Arzt über alle grippeähnlichen Beschwerden – sowohl wenn diese innerhalb des Monats vor der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL aufgetreten sind, als auch jederzeit während der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Mit vielen HIV-Tests kann eine vor kurzem erfolgte Ansteckung nicht nachgewiesen werden. Falls Sie grippeähnliche Beschwerden bekommen, könnte dies bedeuten, dass Sie sich vor kurzem mit HIV angesteckt haben. Folgende Beschwerden könnten Anzeichen einer HIV–Infektion sein: <ul style="list-style-type: none">Müdigkeit Fieber Gelenk- oder Muskelschmerzen Kopfschmerzen Erbrechen oder Durchfall Ausschlag Nachtschweiß vergrößerte Lymphknoten im Bereich von Hals oder Leiste
→ Informieren Sie Ihren Arzt über alle grippeähnlichen Beschwerden – sowohl wenn diese innerhalb des Monats vor der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL aufgetreten sind, als auch jederzeit während der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Mit vielen HIV-Tests kann eine vor kurzem erfolgte Ansteckung nicht nachgewiesen werden. Falls Sie grippeähnliche Beschwerden bekommen, könnte dies bedeuten, dass Sie sich vor kurzem mit HIV angesteckt haben. Folgende Beschwerden könnten Anzeichen einer HIV–Infektion sein: <ul style="list-style-type: none">Müdigkeit Fieber Gelenk- oder Muskelschmerzen Kopfschmerzen Erbrechen oder Durchfall Ausschlag Nachtschweiß vergrößerte Lymphknoten im Bereich von Hals oder Leiste
→ Informieren Sie Ihren Arzt über alle grippeähnlichen Beschwerden – sowohl wenn diese innerhalb des Monats vor der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL aufgetreten sind, als auch jederzeit während der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Mit vielen HIV-Tests kann eine vor kurzem erfolgte Ansteckung nicht nachgewiesen werden. Falls Sie grippeähnliche Beschwerden bekommen, könnte dies bedeuten, dass Sie sich vor kurzem mit HIV angesteckt haben. Folgende Beschwerden könnten Anzeichen einer HIV–Infektion sein: <ul style="list-style-type: none">Müdigkeit Fieber Gelenk- oder Muskelschmerzen Kopfschmerzen Erbrechen oder Durchfall Ausschlag Nachtschweiß vergrößerte Lymphknoten im Bereich von Hals oder Leiste
→ Informieren Sie Ihren Arzt über alle grippeähnlichen Beschwerden – sowohl wenn diese innerhalb des Monats vor der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL aufgetreten sind, als auch jederzeit während der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen <p>Während Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL einnehmen, um das Risiko einer Ansteckung mit HIV zu verringern:</p> <ul style="list-style-type: none">Nehmen Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL jeden Tag ein, um Ihr Risiko zu verringern, nicht nur dann, wenn Ihrer Meinung nach ein Risiko für eine HIV-Infektion besteht. Lassen Sie keine Dosen von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL aus und unterbrechen Sie die Einnahme nicht. Das Auslassen von Dosen könnte Ihr Risiko einer Ansteckung mit HIV erhöhen. Lassen Sie sich regelmäßig auf HIV testen. Wenn Sie glauben, sich mit HIV angesteckt zu haben, informieren Sie umgehend Ihren Arzt. Es werden möglicherweise weitere Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass Sie nach wie vor HIV-negativ sind. Die Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL allein kann die Ansteckung mit HIV unter Umständen nicht vermeiden. <ul style="list-style-type: none">Praktizieren Sie stets Safer Sex. Verwenden Sie Kondome, um den Kontakt mit Samen, Vaginalflüssigkeit oder Blut zu verringern. Verwenden Sie persönliche Gegenstände, auf denen sich Blut oder Körperflüssigkeiten befinden können – beispielsweise Zahnbürsten und Rasierklingen – nicht gemeinsam mit anderen Personen. Nadeln oder anderes Injektions- oder Drogenbesteck dürfen nicht gemeinsam mit anderen Personen verwendet bzw. wiederverwendet werden. Lassen Sie sich auf andere sexuell übertragbare Infektionskrankheiten wie Syphilis und Gonorrhoe testen. Solche Infektionen erleichtern die Ansteckung mit HIV.
Falls Sie weitere Fragen dazu haben, wie Sie die Ansteckung mit HIV oder die Weitergabe von HIV an andere Personen verhindern können, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Während Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL einnehmen, um HIV zu behandeln oder um das Risiko einer Ansteckung mit HIV zu verringern:
• Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL kann Auswirkungen auf Ihre Nieren haben. Vor Beginn und während der Behandlung wird Ihr Arzt möglicherweise Blutuntersuchungen anordnen, um Ihre Nierenfunktion zu kontrollieren. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie früher eine Nierenerkrankung hatten oder wenn Untersuchungen auf Nierenprobleme hingewiesen haben. Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL sollte nicht bei Jugendlichen mit bestehenden Nierenproblemen angewendet werden. Falls Sie Nierenprobleme haben, wird Ihr Arzt Ihnen möglicherweise raten, die Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL abzubrechen oder falls Sie bereits HIV haben, Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL seltener als üblich einzunehmen. Die Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL wird nicht empfohlen, wenn Sie eine schwere Nierenerkrankung haben oder Sie Dialyse-Patient sind. Knochenprobleme (die manchmal zu Knochenbrüchen führen) können auch in Folge von Schäden an den Zellen der Nierenkanälchen auftreten (siehe Abschnitt 4, <i>Welche Nebenwirkungen sind möglich?</i>).
• Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie schon einmal an einer Lebererkrankung, einschließlich einer Hepatitis, gelitten haben. Bei mit HIV infizierten Patienten, die eine Lebererkrankung haben, wie eine chronische Hepatitis B oder C, und

antiretrovirale Arzneimittel erhalten, ist das Risiko für das Auftreten schwerwiegender, möglicherweise tödlich verlaufender Leberkomplikationen erhöht. Wenn Sie Hepatitis B oder C haben, wird Ihr Arzt sorgfältig das bestmögliche Behandlungsschema für Sie auswählen.

- Klären Sie, ob Sie mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) infiziert sind**, bevor Sie mit der Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL beginnen. Falls Sie Hepatitis B (HBV) haben, besteht ein ernstes Risiko für Leberprobleme nach dem Abbruch der Anwendung von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL, unabhängig davon, ob Sie auch HIV haben oder nicht. Es ist wichtig, dass Sie die Behandlung mit Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL nicht abbrechen, ohne mit Ihrem Arzt zu sprechen. Siehe Abschnitt 3, *Brechen Sie die Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL nicht ab*.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, falls Sie älter als 65 Jahre sind.** Die Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL wurde nicht bei Patienten im Alter von über 65 Jahren untersucht.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, falls Sie eine Lactoseintoleranz** haben (siehe *Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält Lactose* weiter unten in diesem Abschnitt).

Kinder und Jugendliche
Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL ist nicht für die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren vorgesehen.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL zusammen mit anderen Arzneimitteln <p>Nehmen Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL nicht ein, wenn Sie bereits Arzneimittel einnehmen, die die Wirkstoffe von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL, Emtricitabin und Tenofovirdisoproxil, enthalten, oder andere antivirale Arzneimittel, die Tenofoviralafenamid, Lamivudin oder Adefovirdipivoxil enthalten.</p>

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL zusammen mit anderen Arzneimitteln <p>Nehmen Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL nicht ein, wenn Sie bereits Arzneimittel einnehmen, die die Wirkstoffe von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL, Emtricitabin und Tenofovirdisoproxil, enthalten, oder andere antivirale Arzneimittel, die Tenofoviralafenamid, Lamivudin oder Adefovirdipivoxil enthalten.</p>
Es ist besonders wichtig, dass Sie Ihren Arzt informieren, wenn Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln anwenden, die Ihre Nieren schädigen können . Dazu gehören: <ul style="list-style-type: none">Aminoglykoside (bei bakteriellen Infektionen) Amphotericin B (bei Pilzkrankungen) Foscarnet (bei Virusinfektionen) Ganciclovir (bei Virusinfektionen) Pentamidin (bei Infektionen) Vancomycin (bei bakteriellen Infektionen) Interleukin-2 (zur Krebsbehandlung) Cidofovir (bei Virusinfektionen) nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAIDs – z.B. Ibuprofen, zur Linderung von Knochen- oder Muskelschmerzen)

Falls Sie ein anderes antiretrovirales Arzneimittel, das als Proteasehemmer bezeichnet wird, zur Behandlung von HIV verwenden, wird Ihr Arzt möglicherweise Blutuntersuchungen anordnen, um Ihre Nierenfunktion engmaschig zu überwachen.

Es ist auch wichtig, dass Sie Ihren Arzt informieren, wenn Sie Ledipasvir/Sofosbuvir, Sofosbuvir/Velpatasvir bzw. Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir zur Behandlung einer Hepatitis-C-Infektion einnehmen.

Gleichzeitige Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL mit anderen, Didanosin enthaltenden Arzneimitteln (zur Behandlung der HIV-Infektion): Die gleichzeitige Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL mit anderen antiviralen Arzneimitteln, die Didanosin enthalten, kann den Blutspiegel von Didanosin ansteigen lassen und die CD4-Zellzahl (bestimmte Zellen im Blut, die für die körpereigene Abwehr wichtig sind) verringern. Seltene Fälle einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse und einer Laktatazidose (Überschuss an Milchsäure im Blut), die manchmal tödlich ausgingen, wurden bei der gleichzeitigen Anwendung von Arzneimitteln, die Tenofovirdisoproxil und Didanosin enthalten, berichtet. Ihr Arzt wird gewissenhaft abwägen, ob Sie mit Tenofovirdisoproxil und Didanosin in Kombination behandelt werden sollen.

→ **Informieren Sie Ihren Arzt**, falls Sie eines dieser Arzneimittel einnehmen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken <ul style="list-style-type: none">Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL sollte, wann immer möglich, zusammen mit einer Mahlzeit eingenommen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

- Obwohl zur Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil während der Schwangerschaft begrenzte klinische Daten vorliegen, wird es üblicherweise nicht angewendet, wenn es nicht absolut unerlässlich ist.
- Frauen im gebärfähigen Alter müssen während der Behandlung mit Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL unbedingt eine wirksame Empfängnisverhütungsmethode anwenden.
- Falls Sie schwanger werden oder eine Schwangerschaft planen, besprechen Sie mit Ihrem Arzt den möglichen Nutzen und die Risiken einer Behandlung mit Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL für Sie und Ihr Kind.

Wenn Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL während der Schwangerschaft eingenommen haben, kann Ihr Arzt Sie zu regelmäßigen Blutuntersuchungen und

anderen diagnostischen Tests einbestellen, um die Entwicklung Ihres Kindes zu überwachen. Bei Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft NRTIs eingenommen haben, überwog der Nutzen durch den Schutz vor HIV das Risiko des Auftretens von Nebenwirkungen.

- Sie dürfen während der Behandlung mit Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL nicht stillen.** Der Grund ist, dass die Wirkstoffe dieses Arzneimittels beim Menschen in die Muttermilch übertreten.
- Es wird empfohlen, dass HIV-infizierte Frauen nicht stillen, um eine Übertragung des Virus über die Muttermilch auf ihr Kind zu vermeiden.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen <p>Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil kann zu Schwindelgefühl führen. Falls während der Behandlung mit Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL ein Schwindelgefühl auftritt, dürfen Sie sich nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen.</p>

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält Lactose <p>Bitte nehmen Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.</p>

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält Natrium <p>Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Tablette, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.</p>
--

3 Wie ist Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL einzunehmen?

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein.** Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Die empfohlene Dosis Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL zur Behandlung von HIV beträgt:
• Erwachsene: 1 Tablette täglich, wann immer möglich zusammen mit einer Mahlzeit.
• Jugendliche im Alter von 12 bis unter 18 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 35 kg: 1 Tablette täglich, wann immer möglich zusammen mit einer Mahlzeit.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Die empfohlene Dosis Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL zur Verringerung des Risikos einer Ansteckung mit HIV beträgt:
• Erwachsene: 1 Tablette täglich, wann immer möglich zusammen mit einer Mahlzeit.
• Jugendliche im Alter von 12 bis unter 18 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 35 kg: 1 Tablette täglich, wann immer möglich zusammen mit einer Mahlzeit.

Falls Sie Schluckbeschwerden haben, können Sie die Tablette mit der Spitze eines Löffels zerdrücken. Mischen Sie die zerdrückte Tablette mit ungefähr 100 ml (ein halbes Glas) Wasser, Orangensaft oder Traubensaft, und trinken Sie das Glas dann unverzüglich aus.

- Nehmen Sie stets die von Ihrem Arzt verordnete Dosis ein.** Damit wird gewährleistet, dass Ihr Arzneimittel seine volle Wirkung entfalten kann und das Risiko einer Resistenzentwicklung gegen die Behandlung verringert wird. Ändern Sie Ihre Dosis nur, wenn Ihr Arzt dies angeordnet hat.
- Falls Sie wegen einer HIV-Infektion behandelt werden**, wird Ihr Arzt Ihnen Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL zusammen mit anderen antiretroviralen Arzneimitteln verschreiben. Bitte lesen Sie in den Packungsbeilagen der anderen antiretroviralen Arzneimittel nach, wie diese Arzneimittel anzuwenden sind.
- Falls Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL zur Verringerung des Risikos einer Ansteckung mit HIV einnehmen**, nehmen Sie Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL jeden Tag ein, nicht nur dann, wenn Ihrer Meinung nach ein Risiko für eine Ansteckung mit HIV besteht.

Falls Sie Fragen dazu haben, wie Sie die Ansteckung mit HIV oder die Weitergabe von HIV an andere Personen verhindern können, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Wenn Sie eine größere Menge von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL eingenommen haben, als Sie sollten <p>Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder die nächste Notaufnahme zur Beratung, wenn Sie versehentlich eine höhere als die empfohlene Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL-Dosis eingenommen haben. Nehmen Sie die Packung mit, damit Sie einfach beschreiben können, was Sie eingenommen haben.</p>

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Wenn Sie die Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL vergessen haben <p>Es ist wichtig, dass Sie keine Einnahme von Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL auslassen.</p>

Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil HEXAL enthält 2 Wirkstoffe: <i>Emtricitabin</i> und <i>Tenofovirdisoproxil</i> . Beide Wirkstoffe sind <i>antiretrovirale</i> Substanzen, die zur Behandlung einer HIV-Infektion dienen. Emtricitabin ist ein <i>Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> und Tenofovir ein <i>Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer</i> . Dennoch werden beide allgemein als NRTI bezeichnet und bewirken eine Störung der normalen Aktivität eines Enzyms (Reverse Transkriptase), das für die eigene Vermehrung des Virus wichtig ist.
Wenn Sie eine Dosis verpasst haben <ul style="list-style-type: none">Wenn Sie innerhalb von 12 Stunden nach der gewohnten Einnahmezeit bemerken, dass Sie eine Dosis ausgelassen haben, nehmen Sie die Tablette so bald wie möglich, bevorzugt zusammen mit Nahrung. Nehmen Sie dann die nächste Dosis zu Ihrer gewohnten Zeit ein. Wenn Sie 12 Stunden oder länger nach der gewohnten Einnahmezeit bemerken, dass Sie eine Dosis ausgelassen haben, holen Sie die versäumte Dosis nicht mehr nach. Warten Sie und nehmen Sie die nächste Dosis zum gewohnten Zeitpunkt ein, bevorzugt zusammen mit Nahrung.

Fortsetzung auf der Rückseite >>