

ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME

Wirkstoffe: Dexpanthenol 0,05 g/1 g,
Chlorhexidinbis(D-gluconat) 0,005 g/1 g

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- **Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.**
- **Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.**
- **Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.**
- **Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.**

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME beachten?
3. Wie ist ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME und wofür wird sie angewendet?

ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME ist ein Hautdesinfektionsmittel.

ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME wird zur antiseptischen Behandlung von oberflächlichen Wunden wie Schürf-, Riss-, Platz- und Kratzwunden, Verbrennungen

1. Grades angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME beachten?

ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe Dexpanthenol und/oder Chlorhexidinbis(D-gluconat) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei tiefen Wunden, Ulcus cruris

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung sind nicht erforderlich.

Anwendung von ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Für ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME liegen keine klinischen Daten zur Anwendung an Schwangeren vor. ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME soll während der Schwangerschaft nicht großflächig angewendet werden.

Für ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME liegen keine klinischen Daten über eine Anwendung während der Stillzeit und zum Übergang in die Muttermilch vor. Stillende sollten ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME nicht im Bereich der Brust und nicht großflächig anwenden.

Fragen Sie grundsätzlich vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME enthält Cetylstearylalkohol

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

3. Wie ist ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei

Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME zweimal täglich dünn auf die Wunde auftragen. Wenn es erforderlich ist, kann die Wunde mit einem geeigneten Verband (Pflaster, Mullverband etc.) versehen werden.

Dauer der Anwendung

Die Behandlungszeit soll 1 bis 2 Wochen nicht überschreiten. Für oberflächliche, nicht infizierte Bagatellverletzungen beträgt die optimale Anwendungsdauer 2 Wochen.

Wenn Sie eine größere Menge ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME angewendet haben, als Sie sollten

Auch bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch (z. B. übermäßigem Auftragen) ist nicht mit Überdosierungserscheinungen zu rechnen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch diese Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

SEHR HÄUFIG:	kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen
HÄUFIG:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
GELEGENTLICH:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
SELTEN:	kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen
SEHR SELTEN:	kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen
NICHT BEKANNT:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Nach dem Auftragen kann GELEGENTLICH ein vorübergehendes Brennen auftreten.

SEHR SELTEN kann es nach dem Auftragen von ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME zu Überempfindlichkeitsreaktionen an der Haut wie allergische Reaktionen vom Soforttyp kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Tube bzw. Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25 °C lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME ist nach Anbruch des Behältnisses 3 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME enthält

Die Wirkstoffe sind Dexpanthenol und Chlorhexidinbis(D-gluconat).

1 g Creme enthält 0,05 g Dexpanthenol und 0,005 g Chlorhexidinbis(D-gluconat).

Die sonstigen Bestandteile sind

Gereinigtes Wasser, Glycerol 85 %, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Paraffin, Glycerolmonostearat 40–55, Macrogolstearat 1500, Dimeticon, Cetomacrogol 1000, Hyetellose

Wie ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME aussieht und Inhalt der Packung

ANTISEPTISCHE WUND + BRAND CREME ist eine weiße Creme und in der Packungsgröße mit 30 g erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

ALIUD PHARMA® GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 19 · D-89150 Laichingen

Hersteller

Wagner & Co. GmbH

Lohesch 60 · D-49525 Lengerich

Zulassungsinhaber

Deutschpharma GmbH & Co. KG

Postfach 55 01 48 · D-44209 Dortmund

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im August 2017 überarbeitet.