

Gebrauchsinformation:
INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

WAS IN DIESER PACKUNGSBEILAGE STEHT

1. Was ist Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen, und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen beachten?
3. Wie ist Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST GLYCERIN SANAVITA 1000 MG ZÄPFCHEN, UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen ist ein Abführmittel für Kleinkinder und Kinder.

GLYCERIN SANAVITA 1000 MG ZÄPFCHEN WIRD ANGEWENDET:

- bei Verstopfung sowie zur Darmentleerung vor rektalen Untersuchungen (Rektoskopie),
- zur Erweichung des Stuhls bei Hämorrhoiden und Analfissuren.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON GLYCERIN SANAVITA 1000 MG ZÄPFCHEN BEACHTEN?

Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen darf nicht angewendet werden,

- wenn Ihr Kind überempfindlich (allergisch) gegenüber Glycerol oder einem der sonstigen Bestandteile von Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen ist,
- bei Vorliegen von Darmverschluss (Ileus) und unklaren Bauchschmerzen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen anwenden.

BEI ANWENDUNG VON GLYCERIN SANAVITA 1000 MG ZÄPFCHEN MIT ANDEREN ARZNEIMITTELN

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Die Aufnahme anderer Arzneistoffe, die im gleichen Zeitraum rektal angewendet werden, kann durch Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen vermindert werden. Wenden Sie daher andere Zäpfchen oder Klistiere zeitlich versetzt an.

VERKEHRSTÜCHTIGKEIT UND DAS BEDIENEN VON MASCHINEN

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. WIE IST GLYCERIN SANAVITA 1000 MG ZÄPFCHEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.



FALLS VOM ARZT NICHT ANDERS VERORDNET, IST DIE ÜBLICHE DOSIS:

Bei Bedarf 1- bis 2-mal täglich etwa 20 bis 30 Minuten vor der beabsichtigten Entleerung 1 Zäpfchen in den After einführen.

ART DER ANWENDUNG

Zum Einführen in den After (rektale Anwendung).
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Glycerin SANAVITA 1000 mg Zäpfchen zu stark oder zu schwach ist.

WENN SIE EINE GRÖßERE MENGE VON GLYCERIN SANAVITA 1000 MG ZÄPFCHEN ANGEWENDET HABEN ALS SIE SOLLTEN

Es kann zu verstärktem Stuhldrang bis Durchfall und ggf. zu Reizerscheinungen im Analfbereich kommen. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- **Sehr selten** (betrifft weniger als 1 Behandelten von 10.000) kann es bei besonders empfindlichen Personen oder bei vorgeschädigter Schleimhaut zu Reizungen der Enddarmschleimhaut kommen.

MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 D-53175 Bonn Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST GLYCERIN SANAVITA 1000 MG ZÄPFCHEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Blister nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Vor Feuchtigkeit geschützt und nicht über 25 °C lagern.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

WAS GLYCERIN SANAVITA 1000 MG ZÄPFCHEN ENTHÄLT

Der Wirkstoff ist Glycerol 85 %.

1 Zäpfchen enthält 1000 mg Glycerol.

Sonstige Bestandteile: Hartfett; leichtes, basisches Magnesiumcarbonat.

WIE GLYCERIN SANAVITA 1000 MG ZÄPFCHEN AUSSIEHT UND INHALT DER PACKUNG

Torpedoförmige, weiße Zäpfchen.

Blisterpackung mit 10 Zäpfchen (N1).

Pharmazeutischer Unternehmer:
SANAVITA Pharmaceuticals GmbH
Spaldingstraße 110 B
20097 Hamburg
Tel +49 (40) 730 88 53-0
Fax +49 (40) 730 88 53-55
Email: info@sanavita.net

Hersteller:
SANAVITA Pharmaceuticals GmbH
Betriebsstätte: Brüder-Grimm-Straße 121
36396 Steinau an der Straße