

Regenaplex Haut-Fluid-W

Homöopathisches Arzneimittel

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Mischung / Zum Aufsprühen auf die Haut

10,0 ml des Arzneimittels enthalten folgende Wirkstoffe:

Achillea millefolium Dil. D 3	1,00 ml
Acidum nitricum Dil. D 8	1,00 ml
Arnica montana Dil. D 4	1,00 ml
Artemisia abrotanum Dil. D 2	1,00 ml
Bellis perennis Dil. D 2	1,00 ml
Carbo animalis Dil. D 10	1,00 ml
Echinacea Dil. D 3	1,00 ml
Hamamelis virginiana Dil. D 2	1,00 ml
Matricaria recutita Dil. D 3	1,00 ml
Nasturtium officinale Dil. D 2	1,00 ml

Hergestellt nach HAB Vorschrift 40a

1 ml entspricht 44 Tropfen:

Apothekenpflichtig

Inhalt 30 ml

Reg.-Nr.: 2522273.00.00

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Pharmazentralnummer – PZN: 15889396

Enthält 51 Vol.-% Alkohol

Vor Gebrauch schütteln!

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

In der Originalpackung dicht verschlossen aufbewahren.

Pharmazeutischer Unternehmer: REGENAPLEX GmbH Homöopathische Komplexmittel,
Robert-Bosch-Str. 3, 78467 Konstanz;

Hersteller: REGENA AG, Poststr. 32-36, CH-8274 Tägerwilen

Gebrauchsinformation:

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Regenaplex Haut-Fluid-W vorschriftsmäßig angewendet werden.

Was müssen Sie vor der Anwendung von Regenaplex Haut-Fluid-W beachten?

Regenaplex Haut-Fluid-W darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Achillea millefolium (Schafgarbe), Arnica montana (Bergwohlverleih), Artemisia abrotanum (Eberraute), Bellis perennis (Gänseblümchen), Echinacea (Sonnenhut), Matricaria recutita (Kamille) oder gegen andere Korbblütler.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Regenaplex Haut-Fluid-W ist erforderlich in der Schwangerschaft und Stillzeit. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung vorliegen, sollte das Arzneimittel dann nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wenden Sie Regenaplex Haut-Fluid-W auch bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt an, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Wie ist Regenaplex Haut-Fluid-W anzuwenden?

Soweit nicht anders verordnet, tragen Sie Regenaplex Haut Fluid W 2-3 mal täglich auf die betroffenen Hautbereiche auf.

Reduzieren Sie die Häufigkeit der Anwendung bei Besserung der Beschwerden.

Hinweis: Das Arzneimittel ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Der Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden soll vermieden werden.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

In seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen auftreten. Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Es wurde über lokale allergische Reaktionen (Entzündungen der Haut) berichtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Hinweis: Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Stand der Information:10/2019