



Anti-Pilz Spray

Gebrauchsinformation

Anti-Pilz Spray, 10 mg/ml, Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung für Kleinnager & Zierkaninchen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Beaphar BV, Drostenkamp 3, NL-8101 BX Raalte / Niederlande.

Bezeichnung des Tierarzneimittels:

Anti-Pilz Spray, 10 mg/ml, Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung für Kleinnager & Zierkaninchen

Wirkstoff: Miconazol

Wirkstoff und sonstige Bestandteile:

Wirkstoff: 1 ml Lösung enthält 10 mg Miconazol

Sonstige Bestandteile: Propylenglycol; Alkohol (Ethanol), vergällt; Wasser

Anwendungsgebiet:

Zur äußerlichen (topischen) Behandlung von Pilzinfektionen der Haut und Hautfalten bei Kleinnagern & Zierkaninchen ab 200 g Körpergewicht, wie z.B.

- Ringelflechte
- Trichophyton

Gegenanzeigen:

Anti-Pilz Spray darf nicht angewendet werden:

- bei kranken, rekonvaleszenten oder säugenden Tieren;
- bei Jungtieren vor der 12. Lebenswoche oder bei Tieren mit einem Körpergewicht unter 200 g;
- in Verbindung mit anderen antibakteriellen oder antiparasitären Produkten;
- bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Miconazol oder einen der sonstigen Bestandteile [siehe Punkt: Nebenwirkungen];
- bei Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Nebenwirkungen:

Die Anwendung von Miconazol im Bereich der Augen kann lokale Irritationen und Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Bei evtl. auftretenden Hautirritationen/-reizungen sollte die Behandlung gestoppt werden.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten: Kleinnager & Zierkaninchen

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die betroffene Stelle 1-2 mal am Tag aus einer Entfernung von 5-10 cm einsprühen, bis sie feucht ist.

Die Einzeldosis für alle Zieltierarten ist abhängig vom Körpergewicht. Wiegen Sie Ihr Tier und besprühen Sie die betroffene Stelle mit der für das Körpergewicht maximal zulässigen Anzahl an Pumpstößen:



Körpergewicht:	maximale Anzahl an Pumpstößen:
<200 g	nicht anwenden bei Tieren <200 g Körpergewicht
200 - 400 g	0,4 ml = 2 Pumpstöße
401 - 600 g	0,6 ml = 3 Pumpstöße
601 - 800 g	0,8 ml = 4 Pumpstöße
801 - 1.000 g	1,0 ml = 5 Pumpstöße

Wiederholen Sie die tägliche Anwendung bis sich der Hautzustand Ihres Tieres verbessert. Die maximale Anwendungsdauer beträgt 14 Tage. Suchen Sie den Rat eines Tierarztes, wenn die betroffene Hautstelle nach 14 Tagen weiterhin Krankheitszeichen aufweist.

Hinweise für die richtige Anwendung:

Entfernen Sie das Trinkwasser des Tieres während der direkten Behandlung. Behandeln Sie alle Tiere zur gleichen Zeit. Pumpflasche immer senkrecht halten.

Wartezeit:

Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Besondere Lagerungshinweise:

Tierarzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. In Originalverpackung aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Besondere Warnhinweise:

Anti-Pilz Spray ist für den äußerlichen Gebrauch zur Behandlung von Pilzinfektionen ausschließlich bei Kleinnagern & Zierkaninchen bestimmt und darf weder von Tieren noch von Menschen innerlich aufgenommen werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Beachten Sie die Dosierungsanweisungen. Eine Überdosierung kann gesundheitsschädlich sein. Miconazol sollte nach Möglichkeit nicht mit anderen Arzneimitteln kombiniert werden, da es eine Reihe von Cytochrom P450 Enzymen inhibiert. Dies kann zu einer langsameren oder zum unvollständigen Abbau verschiedener Arzneimittel und somit möglicherweise zu toxischen Arzneimittelwirkungen führen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut. Tragen Sie geeignete Handschuhe während der Anwendung und waschen Sie nach der Anwendung Ihre Hände mit Wasser und Seife. Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung:

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Stand der Information: September 2013.

Inhalt: 50 ml

Beaphar B.V., Drostenkamp 3, NL-8101 BX Raalte / Niederlande.

www.beaphar.com

333879-A