

Abführtabletten

Redcare Bisacodyl 5 mg
Magensaftresistente Tabletten

Wirkstoff: Bisacodyl
Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- ♥ Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- ♥ Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- ♥ Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- ♥ Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg beachten?
3. Wie ist Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg und wofür wird es angewendet?

Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg ist ein Abführmittel aus der Gruppe der Triarylmethane. Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die einen erleichterten Stuhlgang erfordern.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg beachten?

Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg darf nicht angewendet werden,

- ♥ wenn Sie allergisch gegen Bisacodyl oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- ♥ bei Darmverschluss.

Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg sollte nicht angewendet werden,

- ♥ bei akut-entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg einnehmen.

Einnahme von Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisacodyl kann den Kaliumverlust durch andere Arzneimittel (z.B. harntreibende Mittel) verstärken.

Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg enthält Lactose.

Bitte nehmen Sie Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg enthält Gelborange-S-Aluminiumsalz.

Gelborange-S-Aluminiumsalz kann allergische Reaktionen hervorrufen.

3. Wie ist Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 6 Jahre abends je nach Bedarf 1 bis 2 Tabletten ein. Die Dosis sollte 0,3 mg Bisacodyl pro Kilogramm Körpermasse nicht überschreiten. Der Wirkungseintritt erfolgt nach 6 bis 10 Stunden.

Art der Anwendung

Bisacodyl-Tabletten sind mit reichlich Flüssigkeit einzunehmen.

Dauer der Anwendung

Eine längere Anwendung von Bisacodyl sollte nicht ohne ärztliche Anweisung erfolgen. Jede über eine kurzdauernde Anwendung hinausgehende Einnahme von Bisacodyl führt zu einer Verstärkung der Darmträgheit.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind bei kurzfristiger Einnahme selten.

Bei längerdauernder oder hochdosierter Anwendung kommt es häufig zum Verlust von Kalium und anderen Elektrolyten. Dies kann zu Störungen der Herzfunktion und zu Muskelschwäche führen, insbesondere bei gleichzeitiger Einnahme von harntreibenden Mitteln und Nebennierenrindenhormonen. Die Empfindlichkeit gegenüber Herzglykosiden wird verstärkt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,
Abt. Pharmakovigilanz,
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3,
D-53175 Bonn,
Website: <http://www.bfarm.de>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 30°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg enthält

Der Wirkstoff ist: Bisacodyl.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat, Hypromellose, Gereinigtes Wasser, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.) (Typ C; relative Molmasse: ca. 250000), Talkum, Triethylcitrat, Titandioxid, Gelborange-S-Aluminiumsalz, Chinolingelb, Hochdisperses Siliciumdioxid.

Wie Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg aussieht und Inhalt der Packung

Orangefarbene, runde, bikonvexe, magensaftresistente Tabletten, die auf einer Seite die Prägung „B5“ aufweisen und auf der anderen Seite glatt sind.

PVC / Aluminium Blister

Packungen mit 20, 50 oder 100 magensaftresistenten Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Fairmed Healthcare GmbH
Dorotheenstraße 48
22301 Hamburg
pv@fair-med.com

Hersteller

Fairmed Healthcare GmbH
Maria-Goeppert-Straße 3
23562 Lübeck

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2025.

FAIRMED® Healthcare	Mock-up Information and Approval			FAIRMED reference no.: AW-25-062
Product Name:	Abführtabletten Redcare Bisacodyl 5 mg Magensaftresistente Tabletten		Braille: n.a.	
Version no.:	PLBISA5DEBAPNUD1.2			
Strength:	5 mg	Serialisation: no		
Component:	leaflet	Pack size: n.a.		
PZN/EAN:	n.a.	Market: DE		
Dimension:	148 x 300 mm		Colour information: ● CMYK 0/0/0/100	
Keyline ID:	PACK INSERT KLD BISACODYL // Pharma Code: 2513; Artwork Code: ULit-715			
Manufacturer:	BAP			
Reason of revision:	new product, new supplier			
Mock-up revised by:	customer			
Reviewed and approved by	FAIRMED RA 1	FAIRMED RA 2	CUSTOMER n.a.	
	Min. font size: 1.2 mm (measured on small x Times New Roman)			