

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung:

België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg Almirall N.V. Tél/Tel: +32 (0)2 771 86 37	Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 70 00
България/Еesti/Ελλάδα/España/Hrvatska/ Κύπρος/Latvija/Lietuva/Magyarország/Malta/ România/Slovenija Almirall, S.A. Тел./Tel/Τηλ: +34 93 291 30 00	Italia Almirall SpA Tel.: +39 02 346181
Česká republika/Slovenská republika Almirall s.r.o Tel: +420 739 686 638	Nederland Almirall B.V. Tel: +31 (0)307991155
Danmark/Norge/Sverige Almirall ApS Tlf/Tel: +45 70 25 75 75	Österreich Almirall GmbH Tel.: +43 (0)1/595 39 60
Deutschland Almirall Hermal GmbH Tel.: +49 (0)40 72704-0	Polska Almirall Sp.z o. o. Tel.: +48 22 330 02 57
France Almirall SAS, 1 Tél.: +33(0)1 46 46 19 20	Portugal Almirall - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel.: +351 21 415 57 50
Ireland/United Kingdom (Northern Ireland) Almirall, S.A. Tel: +353 (0) 1431 9836	Suomi/Finland Orion Pharma Puh/Tel: +358 10 4261

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2023.

Weitere Informationsquellen
Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur <http://www.ema.europa.eu/> verfügbar.


GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor Anwendung der Fertigspritzen:

- Wichtige Hinweise**
- Bevor Sie die Ilumetri-Fertigspritzen anwenden, lesen Sie die Gebrauchsanleitung genau durch und befolgen Sie alle Anwendungshinweise sorgfältig und Schritt für Schritt. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und sehen Sie bei Bedarf wieder darin nach.
 - Die Fertigspritzen dürfen nicht geschüttelt werden.
 - Lesen Sie sich die Packungsbeilage von Ilumetri durch, um mehr über Ihr Arzneimittel zu erfahren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

So sieht die Ilumetri-Fertigspritze aus:



VORBEREITUNG

- Nehmen Sie die Packung aus dem Kühlschrank (bei Aufbewahrung im Kühlschrank)**
 - Stellen Sie sicher, dass die Dosis der Spritze mit der von Ihrem Arzt verschriebenen Dosis übereinstimmt.
 - Für eine Dosis von 100 mg wird eine Spritze benötigt und für eine Dosis von 200 mg werden zwei Spritzen benötigt.
 - Nehmen Sie einen Umkarton aus dem Kühlschrank und legen Sie den ungeöffneten Originalumkarton auf eine saubere und ebene Arbeitsfläche.
- Warten Sie 30 Minuten (bei Aufbewahrung im Kühlschrank)**
 - Lassen Sie die Fertigspritze im Umkarton (mit geschlossener Lasche) 30 Minuten bei Raumtemperatur liegen.
- Überprüfen Sie das Arzneimittel**
 - Nehmen Sie die Fertigspritze aus dem Umkarton, wenn Sie für die Injektion bereit sind.
 - Überprüfen Sie das Verfalldatum auf dem Umkarton und der Fertigspritze und entsorgen Sie die Spritze, wenn das Verfalldatum abgelaufen ist.
 - Nadelschutzkappe ERST abziehen, wenn Sie für die Injektion bereit sind.
 - Überprüfen Sie Ilumetri vor der Anwendung visuell auf Partikel und Verfärbungen.
 - Ilumetri ist eine klare bis leicht schillernde und farblose bis leicht gelbliche Lösung.
 - NICHT anwenden, wenn die Lösung sichtbare Partikel enthält oder die Spritze beschädigt ist. **Es können Luftblasen vorhanden sein. Diese müssen nicht entfernt werden.**
 - Produkt NICHT verwenden, wenn es auf eine harte Oberfläche gefallen oder beschädigt ist.



- Stellen Sie alles Notwendige zusammen, was Sie benötigen**
 - Platzieren Sie auf einer sauberen und gut ausgeleuchteten Arbeitsfläche:
 - Alkoholtupfer
 - Wattebausch oder Mulltupfer
 - Klebepflaster
 - durchstichsicheren Entsorgungsbehälter
- Waschen Sie sich Ihre Hände**
 - Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und Wasser.



- Wählen Sie Ihre Injektionsstelle aus**
 - Wählen Sie eine Injektionsstelle mit **erscheinungsfreier Haut** und einfachem Zugang aus, z. B. am **Bauch, Oberschenkel oder Oberarm**.
 - NICHT in einem Umkreis von 5 cm rund um den Nabel oder an Stellen injizieren, an denen die Haut schmerzempfindlich, blutunterlaufen, auffällig rot, hart oder von Schuppenflechte betroffen ist.
 - NICHT direkt in Narben, Dehnungsstreifen oder Blutgefäße injizieren.
 - Der Oberarm eignet sich nur als Injektionsstelle, wenn Ihnen jemand anderes die Injektion verabreicht.
 - Wechseln Sie für jede Verabreichung die Injektionsstelle.
 - **Falls Ihre Dosis 200 mg (2 x 100-mg-Fertigspritze) beträgt, wählen Sie für die zweite Injektion eine andere Stelle.**
- Reinigen Sie die Injektionsstelle**
 - Reinigen Sie die Injektionsstelle mit dem Alkoholtupfer und lassen Sie Ihre Haut trocknen.
 - o Berühren Sie die Injektionsstelle nicht mehr vor der Injektion.




INJEKTION
Falls Ihre Dosis 200 mg beträgt, müssen Sie jedes Mal beide Fertigspritzen zur Verabreichung des Arzneimittels anwenden.

- Ziehen Sie die Nadelschutzkappe ab**
 - Fassen Sie die Fertigspritze am Spritzenkörper, ziehen Sie die Nadelschutzkappe wie abgebildet ab und entsorgen Sie diese. Es kann sein, dass 1 oder 2 Flüssigkeitstropfen austreten; das ist normal.
 - o Den blauen Spritzkolben noch NICHT berühren.
 - o NICHT anwenden, wenn die Fertigspritze oder die Nadel verbogen ist.




- Drücken Sie die Haut an der Injektionsstelle zusammen und führen Sie die Nadel ein**
 - Drücken Sie Ihre Haut an der ausgewählten Injektionsstelle sanft zusammen.
 - Stechen Sie die Nadel **in einem 45- bis 90-Grad-Winkel** in die zwischen Ihren Fingern zusammengedrückte Haut.
 - o Legen Sie Ihren Finger NICHT auf den Spritzkolben, während Sie die Nadel einführen.
 - Halten Sie die Fertigspritze ruhig.



- Injizieren Sie das Arzneimittel**
 - Nach dem Einstechen der Nadel lassen Sie die Haut wieder vorsichtig los.
 - Drücken Sie nun den blauen Spritzkolben bis zum Anschlag nach unten. Damit wird der Sicherheitsmechanismus aktiviert, der dafür sorgt, dass die Nadel ganz zurückgezogen wird, nachdem die Injektion verabreicht wurde.
 - o Eine vollständige Dosis wurde dann verabreicht, wenn der blaue Spritzkolben bis zum Anschlag gedrückt wurde und keine Flüssigkeit an der Injektionsstelle ausgetreten ist.



- Entsorgen Sie die verwendete Spritze**
 - Ziehen Sie die Nadel zuerst vollständig aus der Haut, bevor Sie den blauen Spritzkolben loslassen.
 - o Nach dem Loslassen des blauen Spritzkolbens zieht die Sicherheitssperrvorrichtung die Nadel in den Nadelschutz zurück.



- Entsorgen Sie die verwendete Spritze sofort nach Gebrauch und vor Injektion der zweiten Spritze, falls diese erforderlich ist, in einem durchstichsicheren Entsorgungsbehälter.
- Wenn sich Restflüssigkeit oder etwas Blut auf der Injektionsstelle befindet, reinigen Sie diese mit einem Wattebausch oder Mulltupfer OHNE Druck auf die Stelle auszuüben. Bei Bedarf können Sie die Injektionsstelle mit einem Pflaster abdecken.
- Wiederholen Sie das Vorgehen mit der zweiten Spritze an einer anderen Hautstelle, wenn Sie eine 200-mg-Dosis verabreichen.