



Gebrauchsinformation  
Sascupreel ad us. vet.

**Name und Anschrift des Inhabers der Registrierung und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221 501-00, Telefax: 07221 501-210, E-Mail: info@heel.de

**Bezeichnung des Tierarzneimittels**

# Sascupreel

ad us. vet.

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere: Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, kleine Heimtiere (Kleinnager, Kaninchen, Ziervögel)

**Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile:**

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält: Wirkstoffe: Aconitum napellus Dil. D6 10,00 mg, Amanita muscaria Dil. D4 2,50 mg, Ammonium bromatum Dil. D4 5,00 mg, Atropinum sulfuricum Dil. D6 5,00 mg, Citrullus colocynthis Dil. D4 5,00 mg, Cuprum sulfuricum Dil. D6 2,50 mg, Gelsemium sempervirens Dil. D6 5,00 mg, Matricaria recutita Dil. D4 2,50 mg, Passiflora incarnata Dil. D4 5,00 mg, Veratrum album Dil. D6 5,00 mg, Magnesium phosphoricum Dil D6 aquos 5,00 mg. Die Wirkstoffe 1 bis 10 werden über die letzten zwei Stufen gemäß HAB, Vorschrift 11 in Kombination mit Vorschrift 40a mit Wasser für Injektionszwecke gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

**Anwendungsgebiet(e):**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Gegenanzeigen:**

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt. Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt

befragen. Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese bitte dem Tierarzt mit.

**Zieltierart(en):**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, kleine Heimtiere (Kleinnager, Kaninchen, Ziervögel)

**Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:**

Sascupreel ad us. vet. zur subkutanen Injektion.

**Standarddosierung:**

Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:

Pferd, Rind (über 500 kg):

1 mal täglich die Einzeldosis von 10 ml

Pferd, Rind (bis zu 500 kg):

1 mal täglich die Einzeldosis von 5 ml

Schwein:

1 mal täglich die Einzeldosis von 3-5 ml

Schaf, Ziege:

1 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 ml

Großer Hund (über 25 kg):

1 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 ml

Mittelgroßer Hund (15-25 kg):

1 mal täglich die Einzeldosis von 2 ml

Kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze:

1 mal täglich die Einzeldosis von 1-2 ml

Kleine Heimtiere (Kleinnager, Kaninchen, Ziervögel):

1 mal täglich die Einzeldosis von 0,5 ml



### **Initial-/Akutdosierung:**

Bei akuten Beschwerden kann die angegebene Einzeldosis anfangs nach 12 Stunden wiederholt werden, dann mit der Standarddosierung fortfahren.

### **Dosierung zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen:**

Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen die Einzeldosis jeweils in Abständen von 1-4 Tagen verabreichen.

Hinweis: Sascupreel ad us. vet. sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

### **Wartezeiten:**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: Null Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: Null Stunden

### **Besondere Lagerungshinweise:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich. Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

### **Besondere Warnhinweise**

#### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen. Bei Überempfindlichkeit gegen Korbblütler sollte Sascupreel ad us. vet. mit Vorsicht eingesetzt werden. Eine Injektion sollte nur von Tier-

ärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart: Keine.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender: Keine bekannt.

### **Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode:**

Zur Verträglichkeit von Sascupreel ad us. vet. bei trächtigen und laktierenden Tieren bzw. in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation sowie in der Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

### **Wechselwirkungen:**

Keine bekannt. Wenn Sascupreel ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

### **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**

Februar 2020

### **Weitere Angaben**


#### **Packungsgrößen:**

5 und 50 Ampullen zu 5 ml

Sascupreel ad us. vet. ist eine klare, farblose Injektionslösung.


Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 402473.00.00



#### **Farbiger Punkt nach oben!**

Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen lassen.



#### **Farbiger Punkt nach oben!**

Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.

Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.