

BEAVITA KOHLENHYDRAT- & FETTBLOCKER

Med



DE: BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker

Medizinprodukt

- Reduziert die Kalorienaufnahme aus Fetten und Kohlenhydraten inkl. Zucker
- Zur Behandlung und Vorbeugung von Übergewicht und Adipositas
- Verringert den Appetit
- Das Produkt ist auch für Veganer und Vegetarier geeignet

Allgemeine Hinweise:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker anwenden, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt bereits früher verwendet haben. Es kann sein, dass die hier enthaltenen Informationen nach Maßgabe der neuesten Forschungsergebnisse und Daten angepasst worden sind, wenn Sie eine neue Verpackung öffnen. Dieses Medizinprodukt ist nicht verschreibungspflichtig. Trotzdem müssen Sie BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker sorgfältig anwenden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, um sie im Bedarfsfall zurate ziehen zu können.

Dosierung und Anwendung für Erwachsene ab 18 Jahren:

Die Tabletten sind für die orale Einnahme vorgesehen. Die empfohlene Dosis beträgt 3x täglich 2 Tabletten. Diese sind jeweils eine Stunde vor jeder Mahlzeit mit mindestens einem Glas (250 ml) Wasser einzunehmen.

Während der Verwendung von BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker jeden Tag ein Multivitamin und Mineralienpräparat einnehmen. BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker verringert den Gehalt an bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen, die vom Körper aufgenommen werden. Das Vitamin- und Mineralstoffpräparat am besten vor dem Schlafengehen einnehmen, um sicher zu sein, dass die Vitamine und Mineralstoffe auch wirklich vom Körper aufgenommen werden.

Wirkung:

BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker ist ein Medizinprodukt zur Behandlung und Prävention von Übergewicht und Obesitas. Es entfernt Zucker, Kohlenhydrate und Fette aus der Nahrung und sorgt dafür, dass diese aus dem Körper ausgeschieden werden und nicht in den Stoffwechsel gelangen. Gleichzeitig sorgt BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker dafür, dass die Tablette im Magen eine Gelmatrix bildet. Die ruft ein Sättigungsgefühl hervor und verringert den Hunger, sodass die Portionsgröße der Mahlzeit problemlos verkleinert werden kann. Wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung.

Mögliche Nebenwirkungen:

BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker kann kurz nach der Einnahme ein Sättigungsgefühl hervorrufen. Dieses verschwindet oft schnell wieder. Bei Personen mit empfindlichem Magen oder Darm können Bauchschmerzen, Übelkeit, Magenbeschwerden, Magenverstimmungen, Blähungen oder Verstopfung auftreten. Bei anhaltenden Nebenwirkungen ist es empfehlenswert, die Behandlung abzubrechen.

Wechselwirkungen:

Die hohe Fettbindungsfähigkeit von BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker kann sich auf die Aufnahme fettlöslicher Vitamine sowie der Wirkstoffe von Medikamenten auswirken. Das gilt beispielsweise für die Hormone in Empfängnisverhütenden Pillen oder in Präparaten zur Be-

FR : BEAVITA Bloqueur de glucides et de graisses

Dispositif médical

- Réduit l'apport calorique des sucres, des glucides et des graisses
- Réduit l'appétit
- Pour le traitement de la surcharge pondérale et de l'obésité
- Ce produit convient aux véganes et aux végétariens.

Conseil général :

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses, même si vous avez déjà utilisé ce dispositif médical auparavant. Les informations peuvent avoir été adaptées aux dernières notions et données lorsque vous entamez un nouvel emballage. Ce dispositif médical peut être obtenu sans ordonnance. Néanmoins, pour obtenir un bon résultat, nous vous conseillons d'utiliser BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses avec prudence. Veillez conserver ce mode d'emploi au cas où vous devriez le consulter à nouveau par la suite.

Dosage et utilisation par des adultes à partir de 18 ans :

Prendre 2 comprimés 3 fois par jour, une heure avant chaque repas, avec un grand verre d'eau (250 ml).

Prenez une préparation de vitamines et de minéraux tous les jours lorsque vous utilisez BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses. BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses réduit la teneur en certaines vitamines et minéraux absorbés par l'organisme. Prenez de préférence le complément de vitamines et de minéraux avant d'aller vous coucher afin que les vitamines et les minéraux soient bien absorbés par votre organisme.

Action :

Il s'agit d'un dispositif médical pour le traitement de la surcharge pondérale et de l'obésité. Omtec XS élimine les sucres, les glucides et les graisses des aliments et veille à ce qu'ils quittent ensuite l'organisme au lieu de se retrouver dans le métabolisme. En même temps, le comprimé d'Omtec 50 forme une matrice de gel dans l'estomac. Celle-ci crée une sensation de satiété et réduit la faim, de sorte que la taille des portions du repas peut être réduite sans effort. Efficacité prouvée scientifiquement. BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses est destiné aux adultes âgés de 18 ans ou plus.

Effets indésirables éventuels :

BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses peut donner une sensation de satiété peu de temps après l'ingestion. Elle disparaît souvent rapidement. Les personnes ayant un estomac ou des intestins sensibles peuvent souffrir de douleurs abdominales, de nausées, de troubles gastriques, d'indigestion, de gaz ou de constipation. Si les effets secondaires persistent, il est recommandé d'interrompre le traitement.

Interactions :

La forte capacité de fixation des graisses de BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses peut affecter l'absorption des vitamines liposolubles et des principes actifs de médicaments. Cela peut notamment être le cas pour les hormones contenues dans les pilules contraceptives ou dans

IT: BEAVITA Bloccante di carboidrati e grassi

Dispositivo medico

- Per il controllo e la riduzione del peso.
- Riduce l'assorbimento dei carboidrati dagli alimenti
- Riduce l'appetito.
- Il prodotto è adatto a vegani e vegetariani

Raccomandazioni generali:

Raccomandazioni generali: leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di assumere BEAVITA, anche in caso di un precedente utilizzo di questo prodotto medico. Quando si inizia una nuova confezione, le informazioni possono essere adattate alle ultime scoperte e ai dati più recenti. Questo prodotto medico è acquistabile senza prescrizione medica. È necessario, tuttavia, utilizzare BEAVITA con attenzione per ottenere un buon risultato. Conservare le presenti istruzioni di utilizzo in un luogo sicuro: potrebbero servirvi nuovamente in futuro.

Dosaggio e uso (per adulti)

Dose giornaliera consigliata: 2 compresse, 3 volte al giorno BEAVITA bloccante di carboidrati e grassi è destinato all'uso per via orale. Assumere le compresse un'ora prima di un pasto principale, con almeno un bicchiere d'acqua.

BEAVITA bloccante di carboidrati e grassi riduce l'assorbimento di alcune vitamine e minerali da parte dell'organismo. Pertanto, si consiglia di assumere ogni giorno, durante l'uso, un preparato supplementare multivitaminico e minerale, che dovrà essere assunto preferibilmente prima di coricarsi, per garantire l'assorbimento delle vitamine e dei minerali da parte dell'organismo.

Effetto:

BEAVITA bloccante di carboidrati e grassi contiene il principio attivo OmtecXS, che inibisce l'enzima pancreatico alfa-amilasi che scinde l'amido, interrompendo quindi il processo di scissione dei carboidrati. I carboidrati, come anche i grassi e lo zucchero vengono estratti dagli alimenti e legati sotto forma insolubile.

Nello stesso momento, il principio attivo naturale OMTEC50, con la sua forte capacità di legare i grassi, forma una sostanza gelatinosa nello stomaco che si mescola con gli alimenti ingeriti. I nutrienti legati non arrivano in circolo ma vengono eliminati senza essere digeriti. In questo modo si riduce notevolmente l'assunzione di calorie provenienti dai carboidrati. Il principio attivo OmtecXS ritarda inoltre il rapido assorbimento dei carboidrati e quindi svolge un'azione positiva sul livello glicemico, con conseguente riduzione dell'appetito.

L'azione di BEAVITA bloccante di carboidrati e grassi è dimostrata scientificamente.

Effetti collaterali

Finora non sono noti effetti collaterali dannosi. Può succedere tuttavia che dopo l'assunzione percepisca un transitorio senso di sazietà, che di solito scompare dopo breve tempo.

Nelle persone con stomaco o intestino sensibile possono manifestarsi disturbi di stomaco, gonfiore o stitichezza. In caso di effetti collaterali persistenti, si consiglia di ridurre la dose o di interrompere l'assunzione.

Interazioni:

L'elevata capacità di legare i grassi di carboidrati e bloccanti grassi potrebbe influire sulla registrazione di vitamine liposolubili e i principi attivi di medicinali. Nel rispetto per esempio gli ormoni pillole contraccettive o in preparati che vengono utilizzati con il trattamento della menopausa di-

NL: BEAVITA Koolhydraat- en vetblokker

Medisch hulpmiddel

- Vermindert de calorieopname van suikers, koolhydraten en vetten
- Vermindert de eetlust
- Voor de behandeling van overgewicht en obesitas
- Het product is geschikt voor veganisten en vegetariërs.

Algemeen advies:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u BEAVITA koolhydraat- en vetblokker gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Dit medisch hulpmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u BEAVITA koolhydraat- en vetblokker zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Dosering en gebruik voor volwassenen vanaf 18 jaar:

3x daags 2 tabletten, één uur voor de maaltijd innemen met een groot glas water (250 ml). Neem elke dag een multivitamin- en mineralenpreparaat terwijl u BEAVITA koolhydraat- en vetblokker gebruikt. BEAVITA koolhydraat- en vetblokker verlaagt het gehalte aan bepaalde vitamines en mineralen die door het lichaam worden opgenomen. Neem bij voorkeur voor het slapengaan het vitamine- en mineralensupplement om er zeker van te zijn dat de vitamines en mineralen door je lichaam worden opgenomen.

Werking:

Dit is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van overgewicht en obesitas. Omtec XS verwijderd suikers, koolhydraten en vetten uit voeding en zorgt ervoor dat deze vervolgens het lichaam verlaten in plaats van dat deze terecht komen in de stofwisseling. Tegelijkertijd zorgt Omtec 50 ervoor dat de tablet in de maag een gelmatrix vormt. Dat creëert een vol gevoel en vermindert de honger waardoor de portiegrootte van de maaltijd moeiteloos kan worden verkleind. Wetenschappelijk bewezen effectief. BEAVITA koolhydraat- en vetblokker is bedoeld voor volwassenen van 18 jaar of ouder.

Mogelijke bijwerkingen:

BEAVITA koolhydraat- en vetblokker kan een verzadigd gevoel geven kort na de inname. Dit verdwijnt vaak snel. Personen met een gevoelige maag of darmen kunnen last krijgen van buikpijn, misselijkheid, maagklachten, indigestie, gas of obstipatie. Als de bijwerkingen aanhouden wordt aangeraaden de behandeling te staken.

Interacties:

Het hoge verbindende vermogen van koolhydraat- en vetblokker kan van invloed zijn op de opname van in vet oplosbare vitamines en de actieve ingrediënten van geneesmiddelen. Dit betreft bijvoorbeeld de hormonen in anticonceptiepillen of in preparaten die gebruikt worden bij

handlung von Wechseljahresbeschwerden. Arzneimittel zum Einnehmen müssen 1 Stunde vor oder 4 Stunden nach der Einnahme von BEAVITA Kohlenhydratblocker eingenommen werden.

Anwendungsdauer:

Nicht länger als 30 Tage in einer Behandlungsperiode verwenden. Die Behandlung kann nach 4-tägiger Pause wieder aufgenommen werden.

Anwendungsbeschränkungen:

- Holen Sie vor der langfristigen Einnahme des Produkts ärztlichen Rat ein;
- BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker nicht einnehmen, wenn Sie andere Medikamente (z.B. Verhütungsmittel), Vitamine oder essenzielle Fettsäuren einnehmen; Orale Medikamente müssen 1 Stunde vor oder 4 Stunden nach der Einnahme von BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker eingenommen werden. Wenn Sie Medikamente zu den Hauptmahlzeiten einnehmen müssen, sprechen Sie vor der Einnahme von BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker mit Ihrem Arzt.

Kontraindikationen:

BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker nicht einnehmen:

- wenn Sie überempfindlich bzw. allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind;
- wenn Sie an Magen- Darm-Erkrankungen (zum Beispiel Säurereflux, Gastritis, Magen- oder Zwölffinger- Darmgeschwüre, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Divertikulitis), Anzeichen eines Darmverschlusses (drohender oder bestehender mechanischer oder paralytischer Ileus), Gastroparese bei Diabetikern mit Neuropathie, Darmpolypen oder bestehenden schweren Verdauungsstörungen (Verstopfung) leiden oder gelitten haben;
- bei Verstopfung oder anderen Nebenwirkungen müssen Sie BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker sofort absetzen und einen Arzt aufsuchen;
- wenn Sie Warfarin (Blutverdünner) einnehmen;
- wenn Sie untergewichtig sind (Body-Mass-Index (BMI) < 18,5);
- wenn Sie schwanger sind oder stillen;
- nicht für Babys, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche geeignet.

Verwendung während der Schwangerschaft:

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Produkt anwenden.

⚠ Warnhinweise:

- Die Tabletten nicht kauen oder zerbeißen
- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- Bei beschädigter Blister Verpackung nicht verwenden

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält 500 mg OMTEC XS und 375 mg OMTEC 50, mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylcellulose und Magnesiumstearat.

Inhalt: 60 Tabletten

🌡^{25°C} Aufbewahrung:

Bei Zimmertemperatur (zwischen 5 und 25 Grad) in der Originalverpackung an einem trockenen, dunklen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

LOT Verwendbar bis:
Siehe Bodenlasche

MD **Medizinprodukt:**
BEAVITA Kohlenhydrat- & Fettblocker ist gemäß der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG ein Medizinprodukt der Klasse IIA.

Hersteller:
PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Letztes Überarbeitungsdatum dieser Gebrauchsanweisung: August 2022

CE 0481

les préparations utilisées dans le traitement des troubles de la ménopause. Les médicaments par voie orale doivent être pris 1 heure avant ou 4 heures après l'utilisation de BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses.

Durée d'utilisation :

Ne pas utiliser pendant plus de 30 jours consécutifs. Le traitement peut être repris après 4 jours.

Restrictions d'utilisation :

- Demandez un avis médical avant d'utiliser le produit pendant une période prolongée ;
- Ne prenez pas de médicaments, de vitamines ou d'acides gras essentiels en même temps que BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses; les médicaments par voie orale doivent être pris 1 heure avant ou 4 heures après l'utilisation de BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses. Consultez votre médecin avant de prendre BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses si vous devez prendre des médicaments pendant le repas principal ;
- En cas de constipation ou d'autres effets secondaires, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Contre-indications :

Ne prenez pas BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses si :

- Vous êtes hypersensible ou allergique à l'un des ingrédients ;
- Vous souffrez d'une maladie gastro-intestinale (par exemple, reflux acide, gastrite, ulcères ventriculaires ou duodénaux, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, diverticulite), de signes d'occlusion intestinale (iléus mécanique ou paralytique menaçant ou existant), de gastroparésie chez les diabétiques atteints de neuropathie, avez ou avez déjà eu des troubles digestifs sévères (constipation).
- Vous prenez de la warfarine (anticoagulant);
- Vous avez un poids insuffisant (indice de masse corporelle (IMC) < 18,5) ;
- Vous êtes enceinte ou allaitez ;
- Ne convient pas aux bébés ou aux nourrissons ;
- Les enfants et les adolescents ne doivent utiliser BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses qu'après avoir consulté un médecin.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

L'utilisation de BEAVITA Kohlenhydratblocker pendant la grossesse ou l'allaitement n'est pas recommandée.

⚠ Attention :

- Ne pas mâcher ou croquer les comprimés ;
- Maintenir hors de portée des jeunes enfants ;
- Ne pas utiliser lorsque le blister est endommagé.

Composition :

1 comprimé contient 500 mg d'OMTEC XS et 375 mg OMTEC 50, cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose et stéarate de magnésium.

Contenu : 60 comprimés

🌡^{25°C} Mode de conservation :

Conservé entre 5 et 25°C (dans un endroit sec et à l'abri de la lumière), dans l'emballage d'origine et hors de portée des enfants.

LOT **Date limite d'utilisation :**
N'utilisez pas BEAVITA Kohlenhydratblocker après la date indiquée au-dessous de la boîte.

MD **Dispositif médical :**
BEAVITA bloqueur de glucides et de graisses est un dispositif médical de classe Ila conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE.

Fabricant :
PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Date de la dernière révision de ce mode d'emploi : August 2022

sturbi. Farmaco orale dovrebbe essere 1 ora prima o 4 ore dopo l'uso di carboidrati e bloccanti grassi sono applicate.

Durata d'uso:

Non utilizzare per più di 30 giorni in un periodo di trattamento. Il trattamento può ritorno dopo una pausa di 4 giorni essere incluso.

Limitazioni dell'uso:

- assumere il prodotto per lunghi periodi, chiedi consiglio al tuo medico.
- I medicinali per uso orale dovranno essere assunti 1 ora prima o 4 ore dopo l'assunzione di BEAVITA bloccante di carboidrati e grassi; se deve assumere i suoi ulteriori medicinali insieme ai pasti principali, assumi carboidrati soltanto dopo aver consultato il tuo medico.
- In caso di stitichezza o di altri effetti collaterali, si consiglia di interrompere l'assunzione e di consultare un medico.

Controindicazioni:

Non utilizzi il prodotto:

- se presenta intolleranza o allergia a componenti del preparato
- se presenta malattie del tratto gastro-intestinale come p. es. esofagite da reflusso, gastrite, ulcera gastrica o duodenale, morbo di Crohn, colite ulcerosa o diverticolite
- se presenta segni di occlusione intestinale (ileo meccanico o paralitico incompleto o in atto)
- se è affetto da diabete con neuropatia
- se presenta polipi intestinali o disturbi digestivi gravi (stitichezza)
- se assume warfarin (anticoagulante)
- se presenta deficit di peso (Body Mass Index (BMI) < 18.5)
- in gravidanza o durante l'allattamento
- Non adatto a lattanti e bambini piccoli; bambini e adolescenti potranno assumere BEAVITA bloccante di carboidrati e grassi soltanto previa consulenza medica.

Utilizzo durante la gravidanza o l'allattamento:

si sconsiglia l'assunzione durante la gravidanza o l'allattamento.

⚠ Change to Avvertenze:

- Non masticare o mordere la compressa
- Conservare fuori dalla portata dei bambini
- Non usare in caso di danneggiamento della confezione blister

Composizione:

1 compressa contiene 500 mg di OMTEC XS e OMTEC 50 da 375 mg, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa e magnesio stearato.

Contenuto: 60 compresse

🌡^{25°C} Conservazione:

Conservare a temperatura ambiente (5-25°C) nella confezione originale, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce e fuori dalla portata dei bambini.

LOT **Utilizzabile fino al:** vedi fondo della confezione.

MD **Dispositivo medico:**
BEAVITA Bloccante di carboidrati e grassi è un dispositivo medico di classe Ila, secondo la direttiva 93/42/CEE.

Produttore:
PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Ultimo aggiornamento dell'informazione per gli utilizzatori: August 2022

de behandeling van menopauze stoornissen. Orale medicatie moet 1 uur vóór of 4 uur na gebruik van koolhydraat- en vetblokker worden toegepast.

Gebruiksduur:

Gebruik niet langer dan 30 dagen in één behandelingsperiode. De behandeling kan na 4 dagen worden hervat.

Gebruiksbeperkingen:

- Vraag medisch advies voordat u het product langdurig gaat gebruiken;
- Gebruik geen geneesmiddelen, vitamines of essentiële vetzuren tegelijk met koolhydraat- en vetblokker; Orale medicatie moet 1 uur vóór of 4 uur na gebruik van koolhydraat- en vetblokker worden ingenomen. Raadpleeg uw arts voordat u koolhydraat- en vetblokker gebruikt als u tijdens de hoofdmaaltijd medicijnen moet nemen;
- In het geval van obstipatie of andere bijwerkingen, moet u het gebruik onmiddellijk stopzetten en een arts raadplegen.

Contra-indicaties:

Neem koolhydraat- en vetblokker niet als:

- U overgevoelig of allergisch bent voor een van de ingrediënten;
- U een gastro-intestinale aandoeningen (bijv. Zure refluxziekte, gastritis, ventrikel- of duodenulcera, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, diverticulitis), tekenen van darmobstructie (dreigende of bestaande mechanische of paralytische ileus), gastroparese bij diabetici met neuropathie, darmoliepen of bestaande ernstige spijsverteringsstoornissen (obstipatie) heeft of heeft gehad.
- U Warfarine (bloedverdunner) gebruikt;
- U ondergewicht heeft (Body Mass Index (BMI) < 18,5);
- U zwanger bent of geeft borstvoeding;
- Niet geschikt voor baby's of zuigelingen;
- Kinderen en adolescenten mogen koolhydraat- en vetblokker alleen gebruiken na overleg met een arts.

Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding:

Het gebruik van BEAVITA koolhydraat- en vetblokker tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding wordt afgeraden.

⚠ Waarschuwingen:

- Kauw of bijt niet op de tabletten;
- Buiten het bereik van kinderen houden;
- Niet gebruiken als de blisterverpakking beschadigd is.

Samenstelling:

1 tablet bevat 500 mg OMTEC XS en 375 mg OMTEC 50, mikrokristalline cellulose, hydroxypropylcellulose en magnesiumstearaat.

Inhoud: 60 tabletten

🌡^{25°C} Wijze van bewaren:

Tussen de 5 en 25 graden bewaren (op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het bereik van kinderen.

LOT **Uiterste gebruiksdatum:** Gebruik van BEAVITA koolhydraat- en vetblokker niet na de datum op de onderzijde van het doosje.

MD **Medisch hulpmiddel:**
BEAVITA Koolhydraat- en vetblokker is een medisch hulpmiddel klasse Ila conform de medische hulpmiddel richtlijn 93/42/EEC.

Fabrikant:
PK Benelux BV
Vluchtoord 17
5406 XP Uden, NL

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: August 2022

V1.2 21995212005