



Hyrimoz® 40 mg
Injektionslösung in einer Fertigspritze

Adalimumab
40 mg/0,4 ml

SANDOZ

Gebrauchsinformationen/Information für Patienten

Hyrimoz® 40 mg
Injektionslösung in einer Fertigspritze

Adalimumab
40 mg/0,4 ml

SANDOZ

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

• Halten Sie die Packungsbeilage gut. Vielleicht möchten Sie diese Informationen lesen.

• Ihr Arzt wird Ihnen Anweisungen ausstellen, die wichtige Informationen zur Sicherheit enthalten, die Sie vor und während der Behandlung mit Hyrimoz beachten sollten. Folgen Sie diesen Packungsbeilage, den Anweisungen des Arztes und den Anweisungen der Krankenschwester/der Apothekerin und dem Apotheker.

• Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, wenn Sie das gleiche Medikament einnehmen (insbesondere, wenn Sie ein Hebräer/Hebräerin sind, wenn Sie ein Mann/ eine Frau oder ein Kind sind).

• Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

• Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, wenn Sie das gleiche Medikament einnehmen (insbesondere, wenn Sie ein Hebräer/Hebräerin sind, wenn Sie ein Mann/ eine Frau oder ein Kind sind).

• Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Das gilt auch für Hebräer/Hebräerinnen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

- 1 Was ist Hyrimoz und wofür wird es angewendet?
- 2 Was sollten Sie vor der Anwendung von Hyrimoz beachten?
- 3 Wie ist Hyrimoz anzuwenden?
- 4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- 5 Wie ist Hyrimoz aufzubewahren?

Bitte die Packung und weitere Informationen

- 6 Anweisung für die Anwendung

1 Was ist Hyrimoz und wofür wird es angewendet?

Hyrimoz enthält den Wirkstoff Adalimumab, der sich auf die Immunsystem (Abwehrsystem) Ihres Körpers auswirkt.

Hyrimoz ist bei der Behandlung folgender entzündlicher Erkrankungen vorgesehen:

- rheumatoide Arthritis,
- psoriasisiforme Arthritis,
- psoriasisiforme idiopathische Arthritis,
- Entzündisozellulose Arthritis,
- idiopathische Spondylarthritis,
- ankylosierende Spondylarthritis, bei der im Röntgenbild noch keine Verkalkung nachweisbar ist,
- Psoriasis-Arthritis,
- Entzündisozellulose Arthritis,
- Hidradenitis suppurativa (Acne inversa),
- Morbus Crohn,
- Colitis ulcerosa

Der Wirkstoff von Hyrimoz, Adalimumab, ist ein monoklonales Antikörper. Monoklonale Antikörper sind Eiweiße, die sich an ein bestimmtes Zielmolekül (Körper binden).

Dies Zielmolekül ist in diesem Fall Tumornekrosefaktor- α (TNF α). Dieses wird bei den oben genannten entzündlichen Erkrankungen in erhöhten Konzentrationen abgebaut. Durch die Bindung von Hyrimoz an TNF α wird dessen Wirkung und Vermittlung des Entzündungsprozesses bei den genannten Erkrankungen gehemmt.

Rheumatoide Arthritis

Hyrimoz wird angewendet, um die rheumatoide Arthritis bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie ein mäßiges bis schweres rheumatoide Arthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht genug wirken, erhält Sie Hyrimoz, um Ihre rheumatoide Arthritis zu behandeln.

Hyrimoz wird angewendet, um die psoriasisiforme idiopathische Arthritis (psoriasisiforme) rheumatoide Arthritis oder schwere Methotrexat-Behandlung eingesetzt werden.

Hyrimoz kann das Fortschreiten der durch die Erkrankung verursachten Knorpel- und Knochenbeschädigungen der Gelenke verlangsamen und die körperliche Funktionsfähigkeit verbessern.

Hyrimoz wird üblicherweise mit Methotrexat verwendet. Sollte Ihr Arzt die Gabe von Methotrexat als nicht notwendig erachten, kann Hyrimoz auch alleine angewendet werden.

Psoriasisiforme idiopathische Arthritis

Das psoriasisiforme idiopathische Arthritis ist eine entzündliche Gelenkerkrankung.

Hyrimoz wird angewendet, um die psoriasisiforme idiopathische Arthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Das Patienten werden möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die psoriasisiforme idiopathische Arthritis zu behandeln.

Entzündisozellulose Arthritis

Die Entzündisozellulose Arthritis ist eine entzündliche Erkrankung der Gelenke und der Übergänge von Sehnen zu Knochen.

Hyrimoz wird angewendet, um die Entzündisozellulose Arthritis bei Kindern und Jugendlichen ab 6 Jahren zu behandeln.

Das Patienten werden möglicherweise zunächst andere Arzneimittel (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhält Patienten Hyrimoz.

Ankylosierende Spondylarthritis und ankylosierende Spondylarthritis, bei der im Röntgenbild noch keine Verkalkung nachweisbar ist.

Die ankylosierende Spondylarthritis und ankylosierende Spondylarthritis, bei der im Röntgenbild noch keine Verkalkung nachweisbar ist, sind entzündliche Erkrankungen der Wirbelsäule.

Hyrimoz wird angewendet, um diese Erkrankungen bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine ankylosierende Spondylarthritis oder ankylosierende Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Hidradenitis suppurativa bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet, um die Hidradenitis suppurativa bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine Hidradenitis suppurativa haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Colitis ulcerosa bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet, um die Colitis ulcerosa bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine Colitis ulcerosa haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Hidradenitis suppurativa bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die Hidradenitis suppurativa bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine Hidradenitis suppurativa haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Morbus Crohn bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Morbus Crohn ist eine entzündliche Erkrankung des Darms.

Hyrimoz wird angewendet zur Behandlung:

- mit mittelschweren bis schweren Morbus Crohn bei Erwachsenen und
- mit mittelschweren bis schweren Morbus Crohn bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Wenn Sie ein Morbus Crohn haben, werden Sie zunächst mit anderen Arzneimitteln behandelt. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten von Morbus Crohn zu vermeiden.

Colitis ulcerosa bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet, um die Colitis ulcerosa bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine Colitis ulcerosa haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Colitis ulcerosa bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die Colitis ulcerosa bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine Colitis ulcerosa haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet zur Behandlung:

- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Erwachsenen und
- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Wenn Sie ein idiopathische Spondylarthritis haben, werden Sie zunächst mit anderen Arzneimitteln behandelt. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet zur Behandlung:

- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Erwachsenen und
- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Wenn Sie ein idiopathische Spondylarthritis haben, werden Sie zunächst mit anderen Arzneimitteln behandelt. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet zur Behandlung:

- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Erwachsenen und
- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Wenn Sie ein idiopathische Spondylarthritis haben, werden Sie zunächst mit anderen Arzneimitteln behandelt. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet zur Behandlung:

- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Erwachsenen und
- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Wenn Sie ein idiopathische Spondylarthritis haben, werden Sie zunächst mit anderen Arzneimitteln behandelt. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet zur Behandlung:

- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Erwachsenen und
- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Wenn Sie ein idiopathische Spondylarthritis haben, werden Sie zunächst mit anderen Arzneimitteln behandelt. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet zur Behandlung:

- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Erwachsenen und
- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Wenn Sie ein idiopathische Spondylarthritis haben, werden Sie zunächst mit anderen Arzneimitteln behandelt. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet zur Behandlung:

- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Erwachsenen und
- mit mittelschweren bis schweren Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Hepatitis-Virus

• Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Träger des Hepatitis-Virus (HBV) sind, wenn Sie ein Antirheumatikum einnehmen, das bei der Behandlung von Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

• Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Träger des Hepatitis-Virus (HBV) sind, wenn Sie ein Antirheumatikum einnehmen, das bei der Behandlung von Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

• Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Träger des Hepatitis-Virus (HBV) sind, wenn Sie ein Antirheumatikum einnehmen, das bei der Behandlung von Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Personen über 65 Jahre

Wenn Sie über 65 Jahre alt sind, können Sie für Infektionen anfälliger sein, während Sie Hyrimoz einnehmen. Wenn Sie über 65 Jahre alt sind, können Sie für Infektionen anfälliger sein, während Sie Hyrimoz einnehmen. Wenn Sie über 65 Jahre alt sind, können Sie für Infektionen anfälliger sein, während Sie Hyrimoz einnehmen.

Chirurgische oder zahnärztliche Eingriffe

• Wenn eine Operation/Chirurgie erforderlich ist, informieren Sie Ihren Arzt über Ihre Behandlung mit Hyrimoz. Ihr Arzt kann ein zeitweiliges Absetzen der Hyrimoz-Behandlung empfehlen.

Bluttransfusionen

• Wenn Sie eine demenzielle Erkrankung (eine Erkrankung, die die Schätzkraft um das Hirn betreffend) haben, wird Ihnen möglicherweise ein Bluttransfusionsmittel verschrieben. Wenn Sie eine demenzielle Erkrankung (eine Erkrankung, die die Schätzkraft um das Hirn betreffend) haben, wird Ihnen möglicherweise ein Bluttransfusionsmittel verschrieben.

Impfungen

• Gewissen Impfstoffen enthält Bestandteile, jedoch abgeschwächte Formen von Krankheitserregern. Bakterien und Viren sollen während der Behandlung mit Hyrimoz nicht verwendet werden, da die Infektionsrisiko erhöht sein könnte. Wenn Sie eine Impfung erhalten, informieren Sie Ihren Arzt über Ihre Behandlung mit Hyrimoz, alle anderen Impflinien zu vermeiden. Wenn Sie Hyrimoz während der Schwangerschaft erhalten haben, kann Ihr Säugling ebenfalls eine Infektion bekommen, wenn Sie Hyrimoz erhalten. Wenn Sie Hyrimoz während der Schwangerschaft erhalten haben, kann Ihr Säugling ebenfalls eine Infektion bekommen, wenn Sie Hyrimoz erhalten.

Herzschrittmacher

• Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt darüber informieren, wenn Sie schwerwiegende Herzprobleme haben oder sich einer Herzschrittmacher-Implantation unterziehen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, wird Ihnen möglicherweise ein Herzschrittmacher verschrieben. Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, wird Ihnen möglicherweise ein Herzschrittmacher verschrieben.

Faktor VIII-Mangel, Hämophilie oder Blasen

• Die Körperenzyme Proteasen von Bakterien, die Infektionen behandeln oder beim Steppen von Blutungen helfen, kann Hyrimoz wirksam sein. Wenn Sie ein Herzschrittmacher bekommen, sollte nicht Faktor VIII-Mangel oder Hämophilie oder Blasen erhalten, bevor Sie Hyrimoz einnehmen.

Krebs

• Es gibt sehr viele Fälle bösartiger Krankheiten bei Kindern und Erwachsenen, die Adalimumab oder anderen Antirheumatika erhalten. Wenn Sie eine Impfung erhalten, informieren Sie Ihren Arzt über Ihre Behandlung mit Hyrimoz, alle anderen Impflinien zu vermeiden. Wenn Sie Hyrimoz während der Schwangerschaft erhalten haben, kann Ihr Säugling ebenfalls eine Infektion bekommen, wenn Sie Hyrimoz erhalten.

Plaque-Porphyrie

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Kindern und Jugendlichen

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Plaque-Porphyrie bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

• Plaque-Porphyrie ist eine entzündliche Erkrankung der Haut. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben. Wenn Sie Plaque-Porphyrie haben, wird Ihnen möglicherweise ein Plaque-Porphyrie verschrieben.

Rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, ankylosierende Spondylitis oder ankylosierende Spondylarthritis, bei der im Röntgenbild noch keine Verkalkung nachweisbar ist

Hyrimoz wird angewendet, um die rheumatoide Arthritis bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine rheumatoide Arthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Erwachsene

Hyrimoz wird angewendet, um die rheumatoide Arthritis bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine rheumatoide Arthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet, um die rheumatoide Arthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine rheumatoide Arthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen

Hyrimoz wird angewendet, um die idiopathische Spondylarthritis bei Erwachsenen zu behandeln. Wenn Sie eine idiopathische Spondylarthritis haben, wird Ihnen möglicherweise zunächst ein Antirheumatikum (Basistherapie wie Methotrexat) verschrieben. Wenn diese Arzneimittel nicht gut genug wirken, erhalten Sie Hyrimoz, um die Ankylosierung und das Fortschreiten Ihrer Erkrankung zu vermeiden.

Idiopathische Spondylarthritis bei Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen im Alter von 2 bis 17 Jahren

