

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Korbblütler. Die Anwendung von Presselin Gri H wird nicht empfohlen bei Immunsuppression (z. B. nach Organ- oder Knochenmarktransplantation). Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden in Einzelfällen allergische Reaktionen wie z. B. Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen (z. B. Neurodermitis, allergisches Asthma, Heuschnupfen) besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko allergischer Reaktionen. Deshalb sollte Presselin Gri H von Patienten mit atopischen Erkrankungen nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Die Einnahme von Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut wird in Einzelfällen mit dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Bei einer Langzeitanwendung (länger als 8 Wochen) wurde in einem Einzelfall eine Verminderung der weißen Blutzellen berichtet. Wegen nicht ausreichender Untersuchungen sollte das Arzneimittel nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit und auch nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Presselin Gri H enthält Ethanol (Alkohol)

Dieses Arzneimittel enthält 14 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosiereinheit (1 Tropfen). Die Menge in einer Dosis (20 Tropfen) dieses Arzneimittels entspricht weniger als 7 ml Bier oder 3 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Dosieranleitung: Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine

über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Vor Gebrauch schütteln.

Wechselwirkungen: Keine bekannt. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Nebenwirkung: In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Hinweis: Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit: Nach Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Nicht über 25°C lagern. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusammensetzung:

100 g (= 110 ml) enthalten: Aconitum D4 4 g, Barium carbonicum D9 4 g, Belladonna D4 4 g, Bryonia D2 4 g, Echinacea Ø 40 g, Eupatorium perfoliatum Ø 1 g, Ferrum phosphoricum D9 4 g, Gelsemium D4 4 g, Ipecacuanha D4 4 g, Kalium chloratum D3 1 g, Hydrargyrum bichloratum D8 0,5 g, Phytolacca D2 4 g, Sabadilla D4 4 g.

Sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser.

1 g entspricht 36 Tropfen.

Anwendungsgebiete: Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Hersteller:

Kattwiga Arzneimittel GmbH

Zur Grenze 30

48529 Nordhorn

Ch.-B.:

verwendbar bis:

100ml

V. 202306-A3



PZN - 18834349



Presselin[®]
Gri H

Tropfen zum Einnehmen
Apothekenpflichtig

Combustin Pharmazeutische Präparate GmbH | Offinger Str. 3 | 88525 Dürmentingen

HOMÖOPATHISCHES ARZNEIMITTEL

► Gebrauchsinformation:
HIER ÖFFNEN