

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Symbicort Turbohaler 160/4,5 Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation

Budesonid, Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Symbicort Turbohaler und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Symbicort Turbohaler beachten?
3. Wie ist Symbicort Turbohaler anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Symbicort Turbohaler aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST SYMBICORT TURBOHALER UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Symbicort Turbohaler 160/4,5 Mikrogramm/Dosis ist ein Inhalator zur Behandlung von Asthma bei Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Er wird auch zur Behandlung von Symptomen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) bei Erwachsenen im Alter von 18 Jahren und älter angewendet. Er enthält zwei unterschiedliche Wirkstoffe: Budesonid und Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.).

- Budesonid gehört zu einer Gruppe von Wirkstoffen, die man Kortikosteroide nennt. Durch Budesonid können Schwellungen und Entzündungen in den Lungen verringert und verhindert werden.
- Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.) gehört zu einer Gruppe von Wirkstoffen, die man lang wirksame Beta₂-Adrenozeptor-Agonisten oder Bronchodilatoren nennt. Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.) kann die Atmung erleichtern, indem es die Muskeln in den Atemwegen entspannt.

Asthma

Für eine Behandlung des Asthmas kann Symbicort Turbohaler zwei verschiedenen Konzepten gemäß verordnet werden:

a) Einigen Patienten werden zwei Asthma-Inhalatoren verordnet: Symbicort Turbohaler und ein separater Inhalator für den Bedarfsfall.

- Diese Patienten wenden Symbicort Turbohaler jeden Tag an. Dies hilft, das Auftreten von Asthmasymptomen zu verhindern.
- Wenn diese Patienten Asthmasymptome bekommen, wenden sie ihren Inhalator für den Bedarfsfall an, um die Atmung zu erleichtern.

b) Einigen Patienten wird Symbicort Turbohaler als einziger Asthma-Inhalator verschrieben.

- Diese Patienten wenden Symbicort Turbohaler jeden Tag an. Dies hilft, das Auftreten von Asthmasymptomen zu verhindern.
- Wenn diese Patienten bei Auftreten von Asthmasymptomen weitere Inhalationen zur Erleichterung der Atmung benötigen, wenden sie ebenfalls Symbicort Turbohaler an, um die Atmung zu erleichtern, und nach Absprache mit dem Arzt auch, um dem Auftreten von Asthmasymptomen vorzubeugen (z. B. bei sportlicher Betätigung oder wenn sie Allergenen ausgesetzt sind). Bei diesen Patienten ist dafür kein separater Inhalator erforderlich.

Chronisch obstruktive Atemwegserkrankung (COPD)

Symbicort Turbohaler kann auch zur Behandlung der Symptome einer COPD bei Erwachsenen angewendet werden. COPD ist eine chronische Erkrankung der Atemwege, die häufig durch das Zigarettenrauchen verursacht wird.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SYMBICORT TURBOHALER BEACHTEN?

Symbicort Turbohaler darf nicht angewendet werden,

wenn Sie allergisch gegen Budesonid, Formoterol, Milchprotein oder den in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Symbicort Turbohaler anwenden, wenn Sie

- Diabetiker sind.
- eine Lungeninfektion haben.
- Bluthochdruck haben oder bei Ihnen schon einmal eine Herzerkrankung festgestellt wurde (einschließlich unregelmäßigen Herzschlags, sehr schnellen Pulses, Arterienverengung oder Herzinsuffizienz).
- eine Erkrankung der Schilddrüse oder der Nebennieren haben.
- einen niedrigen Blutkaliumspiegel haben.
- eine schwere Lebererkrankung haben.

Wenn bei Ihnen verschwommenes Sehen oder andere Sehstörungen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Auswirkungen bei Fehlgebrauch zu Dopingzwecken

Die Anwendung von Symbicort Turbohaler kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. Durch eine Anwendung von Symbicort Turbohaler als Dopingmittel können schwerwiegende Herzrhythmusstörungen ausgelöst werden.

Anwendung von Symbicort Turbohaler zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/ange-

wendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker insbesondere, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel anwenden:

- Betablocker (wie Atenolol oder Propranolol zur Behandlung von Bluthochdruck), einschließlich Augentropfen (wie Timolol zur Behandlung eines Glaukoms).
- Wirkstoffe zur Behandlung eines zu schnellen oder unregelmäßigen Herzschlags (wie Chinidin).
- Wirkstoffe wie Digoxin, die oft zur Behandlung einer Herzinsuffizienz verwendet werden.
- Diuretika (harntreibende Mittel, z. B. Furosemid). Diese werden zur Behandlung von Bluthochdruck verwendet.
- Kortikosteroide zum Einnehmen (z. B. Prednisolon).
- Arzneimittel, die Xanthine (z. B. Theophyllin oder Aminophyllin) enthalten. Diese werden oft zur Behandlung von Asthma verwendet.
- Andere Bronchodilatoren (z. B. Salbutamol).
- Trizyklische Antidepressiva (z. B. Amitriptylin) und das Antidepressivum Nefazodon.
- Arzneimittel, die Phenothiazine (z. B. Chlorpromazin und Prochlorperazin) enthalten.
- Sogenannte HIV-Proteasehemmer (z. B. Ritonavir) zur Behandlung von HIV-Infektionen.
- Wirkstoffe zur Behandlung von Infektionen (z. B. Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol, Posaconazol, Clarithromycin und Telithromycin).
- Wirkstoffe zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit (z. B. L-Dopa).
- Wirkstoffe zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen (z. B. L-Thyroxin).

Wenn eine der oben genannten Angaben auf Sie zutrifft oder falls Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie vor der Anwendung von Symbicort Turbohaler mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker ebenfalls, wenn bei Ihnen eine Narkose wegen einer Operation oder einer Zahn- bzw. Kieferbehandlung geplant ist.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

- Wenn Sie schwanger sind oder planen, schwanger zu werden, sprechen Sie vor der Anwendung von Symbicort Turbohaler mit Ihrem Arzt – wenden Sie Symbicort Turbohaler nur auf ausdrückliche Anweisung Ihres Arztes an.
- Wenn Sie während der Anwendung von Symbicort Turbohaler schwanger werden, brechen Sie die Behandlung mit Symbicort Turbohaler nicht ab, aber wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt.
- Wenn Sie stillen möchten, wenden Sie sich bitte vor der Anwendung von Symbicort Turbohaler an Ihren Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Symbicort Turbohaler hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf Ihre Verkehrstüchtigkeit oder Ihre Fähigkeit zum Bedienen von Werkzeugen oder Maschinen.

Symbicort Turbohaler enthält Lactose

Symbicort Turbohaler enthält eine Art von Zucker, die Lactose heißt. Wenn Sie von Ihrem Arzt wissen, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben, sprechen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels mit Ihrem Arzt. Die in diesem Arzneimittel enthaltene Lactosemenge verursacht gewöhnlich keine Probleme bei Personen mit einer Lactoseunverträglichkeit. Der sonstige Bestandteil Lactose enthält geringe Mengen Milchprotein, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

3. WIE IST SYMBICORT TURBOHALER ANZUWENDEN?

- Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.
- Es ist wichtig, dass Sie Symbicort Turbohaler jeden Tag anwenden, auch dann, wenn Sie keine Asthma- oder COPD-Beschwerden haben.
- Ihr Arzt wird Ihre Behandlung regelmäßig überwachen.

Wenn Sie bereits Steroidtabletten zur Behandlung Ihres Asthmas oder Ihrer COPD einnehmen, wird Ihr Arzt die Anzahl der Tabletten, die Sie einnehmen, verringern, sobald Sie beginnen, Symbicort Turbohaler anzuwenden. Wenn Sie schon lange Zeit Steroidtabletten einnehmen, wird Ihr Arzt möglicherweise von Zeit zu Zeit Bluttests durchführen. Nach der Reduzierung der Steroidtabletten kann es sein, dass Sie sich allgemein unwohl fühlen, obwohl sich Ihre Beschwerden in der Brust vielleicht verbessern. Es können Anzeichen wie eine verstopfte oder laufende Nase, Schwäche oder Gelenk- oder Muskelschmerzen sowie Ausschlag (Ekzem) auftreten. Wenn eines dieser Anzeichen Sie beeinträchtigt oder wenn Anzeichen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit oder Erbrechen auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt. Es kann sein, dass Sie ein anderes Medikament einnehmen müssen, wenn bei Ihnen allergische Symptome oder Anzeichen für entzündete Gelenke auftreten. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Symbicort Turbohaler weiter anwenden sollen.

Ihr Arzt wird möglicherweise in Betracht ziehen, Ihnen in Stresssituationen (beispielsweise bei einer Atemwegsinfektion oder vor einer Operation) zusätzlich zu Ihrer üblichen Therapie Steroidtabletten zu verschreiben.

Wichtige Informationen über Ihre Asthma- oder COPD-Beschwerden

Wenn Sie das Gefühl haben, außer Atem zu sein oder pfeifend zu atmen, sollten Sie zunächst Symbicort Turbohaler weiterhin anwenden, aber Ihren Arzt so schnell wie möglich aufsuchen, da Sie möglicherweise eine zusätzliche Behandlung benötigen.

Suchen Sie sofort Ihren Arzt auf, wenn:

- Ihre Atmung sich verschlechtert oder Sie oft nachts mit Beschwerden aufwachen.
- sich bei Ihnen morgens ein Engegefühl in der Brust einstellt oder dieses länger als gewöhnlich anhält.

Diese Anzeichen könnten darauf hinweisen, dass Ihr Asthma oder Ihre COPD nicht ausreichend kontrolliert ist und Sie umgehend eine andere oder eine zusätzliche Behandlung benötigen.

Asthma

Für eine Behandlung des Asthmas kann Symbicort Turbohaler zwei verschiedenen Konzepten gemäß verordnet werden. Die anzuwendende Dosis von Symbicort Turbohaler und der Zeitpunkt der Anwendung hängen davon ab, wie Ihnen das Präparat verschrieben worden ist.

- a) Wenn Ihnen Symbicort Turbohaler und ein separater Inhalator für den Bedarfsfall verschrieben worden sind, lesen Sie bitte den Abschnitt „a) Anwendung von Symbicort Turbohaler und einem separaten Inhalator für den Bedarfsfall“.
- b) Wenn Ihnen Symbicort Turbohaler als einziger Inhalator verschrieben worden ist, lesen Sie bitte den Abschnitt „b) Anwendung von Symbicort Turbohaler als einziger Asthma-Inhalator“.

a) Anwendung von Symbicort Turbohaler und einem separaten Inhalator für den Bedarfsfall

Wenden Sie Ihren Symbicort Turbohaler jeden Tag an. Dies hilft, das Auftreten von Asthmasymptomen zu verhindern.

Erwachsene (18 Jahre und älter)

- Die übliche Dosis ist 1 oder 2 Inhalationen zweimal täglich.
- Ihr Arzt kann die Dosis auf 4 Inhalationen zweimal täglich erhöhen.
- Wenn Ihre Symptome gut kontrolliert sind, kann Ihr Arzt Ihnen dieses Arzneimittel zur einmal täglichen Anwendung verordnen.

Jugendliche (12 bis 17 Jahre)

- Die übliche Dosis ist 1 oder 2 Inhalationen zweimal täglich.
- Wenn Ihre Symptome gut kontrolliert sind, kann Ihr Arzt Ihnen dieses Arzneimittel zur einmal täglichen Anwendung verordnen.

Für Kinder von 6 bis 11 Jahren steht Symbicort Turbohaler in einer niedrigeren Wirkstärke zur Verfügung. Symbicort Turbohaler wird nicht für die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren empfohlen.

Ihr Arzt wird Ihre Behandlung regelmäßig überwachen. Er wird die Dosierung dieses Arzneimittels auf die niedrigste Dosis einstellen, mit der eine Kontrolle Ihrer Asthmasymptome erreicht wird. Verändern Sie die Dosis ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt nicht selbst.

Verwenden Sie Ihren separaten Inhalator für den Bedarfsfall, wenn Asthmasymptome auftreten.

Tragen Sie Ihren Inhalator für den Bedarfsfall immer bei sich, damit Sie ihn anwenden können, wenn Sie ihn benötigen. Verwenden Sie bei Auftreten von Asthmasymptomen nicht Ihren Symbicort Turbohaler – verwenden Sie Ihren separaten Inhalator für den Bedarfsfall.

b) Anwendung von Symbicort Turbohaler als einziger Asthma-Inhalator

Wenden Sie Symbicort Turbohaler in dieser Weise nur dann an, wenn Symbicort Turbohaler Ihnen so von Ihrem Arzt verordnet worden ist und wenn Sie mindestens 12 Jahre alt sind.

Wenden Sie Ihren Symbicort Turbohaler jeden Tag an. Dies hilft, das Auftreten von Asthmasymptomen zu verhindern. Sie können Symbicort Turbohaler wie folgt anwenden:

- 1 Inhalation morgens **und** 1 Inhalation abends **oder**
- 2 Inhalationen morgens **oder**
- 2 Inhalationen abends.

Ihr Arzt kann die Dosis auf 2 Inhalationen zweimal täglich erhöhen.

Wenden Sie Symbicort Turbohaler auch im Bedarfsfall bei Auftreten von Asthmasymptomen an oder um dem Auftreten von Asthmasymptomen vorzubeugen (z. B. bei sportlicher Betätigung oder wenn Sie Allergenen ausgesetzt sind).

- Wenn bei Ihnen Asthmasymptome auftreten, wenden Sie 1 Inhalation an und warten Sie einige Minuten.
- Wenn Sie sich nicht besser fühlen, inhalieren Sie ein weiteres Mal.
- Wenden Sie nicht mehr als 6 Inhalationen unmittelbar nacheinander an.

Tragen Sie Ihren Symbicort Turbohaler-Inhalator immer bei sich, damit Sie ihn anwenden können, wenn Sie ihn benötigen.

Eine Tagesgesamtosis von mehr als 8 Inhalationen ist normalerweise nicht erforderlich. Unter Umständen kann Ihr Arzt Ihnen jedoch bis zu 12 Inhalationen pro Tag für einen begrenzten Zeitraum verordnen.

Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie regelmäßig 8 oder mehr Inhalationen pro Tag anwenden. Möglicherweise muss er dann Ihre Behandlung ändern. Wenden Sie nicht mehr als insgesamt 12 Inhalationen innerhalb von 24 Stunden an.

Wenn Sie z. B. Sport treiben und Asthmasymptome bekommen, wenden Sie Symbicort Turbohaler wie hier beschrieben an. Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Arzt die Anwendung von Symbicort besprechen, um dem Auftreten von Asthmasymptomen vorzubeugen. Wie oft Sie trainieren oder wie oft Sie Allergenen ausgesetzt sind, könnte die Therapie beeinflussen, die Ihnen verschrieben wird.

Chronisch obstruktive Atemwegserkrankung (COPD)

- Nur für die Anwendung bei Erwachsenen (18 Jahre und älter).
- Die übliche Dosis beträgt 2 Inhalationen zweimal täglich.

Zur Behandlung Ihrer COPD-Erkrankung wird Ihr Arzt Ihnen möglicherweise auch andere Arzneimittel verschreiben, die die Bronchien erweitern, z. B. sogenannte Anticholinergika (wie Tiotropium- oder Ipratropiumbromid).

Vorbereitung Ihres neuen Symbicort Turbohaler-Inhalators

Bevor Sie Ihren **neuen** Symbicort Turbohaler-Inhalator **erstmalig** anwenden, müssen Sie ihn wie folgt für die Anwendung vorbereiten:


- Schutzkappe abschrauben und abnehmen. Beim Abschrauben ist ein ratendes Geräusch hörbar.

- Halten Sie Ihren Symbicort Turbohale-Inhalator aufrecht. Das rote Dosier-
rad zeigt nach unten.
- Drehen Sie das rote Dosier-
rad zunächst bis zum Anschlag in eine Richtung
und dann bis zum Anschlag in die andere Richtung (in welche Richtung
zuerst gedreht wird, ist nicht entscheidend). Sie sollten ein Klickgeräusch
hören. Ob das Klickgeräusch während der ersten oder der zweiten Drehung
hörbar ist, ist nicht entscheidend.
- Wiederholen Sie den Vorgang, d. h. drehen Sie das rote Dosier-
rad in beide
Richtungen.
- Ihr Symbicort Turbohale-Inhalator ist jetzt beladen und gebrauchsfertig.


Wie der Inhalator anzuwenden ist

Befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen jedes Mal, wenn Sie inhalieren
müssen.

1. Schutzkappe abschrauben und abnehmen (Abb. 1). Beim Abschrauben ist
ein ratterndes Geräusch hörbar.
2. **Halten Sie Ihren Symbicort Turbohale-Inhalator aufrecht.** Das rote
Dosier-
rad zeigt nach unten.
3. Halten Sie das Mundstück nicht fest, wenn Sie Ihren Symbicort Turbohale-
Inhalator mit einer Dosis beladen. Um Ihren Symbicort Turbohale-Inhala-
tor mit einer Dosis zu beladen, drehen Sie das rote Dosier-
rad zunächst bis
zum Anschlag in eine Richtung (Abb. 2). Drehen Sie es dann bis zum An-
schlag in die andere Richtung (in welche Richtung zuerst gedreht wird, ist
nicht entscheidend). Sie sollten ein Klickgeräusch hören. Ob das Klickge-
räusch während der ersten oder der zweiten Drehung hörbar ist, ist nicht
entscheidend. Ihr Symbicort Turbohale-Inhalator hält jetzt eine Dosis für
die Anwendung bereit. Beladen Sie Ihren Symbicort Turbohale-Inhalator
nur dann mit einer Dosis, wenn Sie diese anwenden müssen.




(Abb. 1)




(Abb. 2)

4. Halten Sie Ihren Symbicort Turbohale-Inhalator von Ihrem Mund weg.
Atmen Sie sanft aus (so weit, wie es für Sie angenehm ist). Atmen Sie nicht
durch Ihren Symbicort Turbohale-Inhalator aus.
5. Platzieren Sie das Mundstück vorsichtig zwischen den Zähnen und um-
schließen Sie es mit den Lippen (Abb. 3). Atmen Sie dann so tief und
kräftig Sie können durch den Mund ein. Nicht auf dem Mundstück kauen
oder beißen.
6. **Setzen Sie Ihren Symbicort Turbohale-Inhalator vom Mund ab.
Atmen Sie sanft aus.** Die inhalierte Substanzmenge ist sehr gering. Das
bedeutet, dass das Arzneimittel nach der Inhalation möglicherweise we-
der zu schmecken noch zu spüren ist. Wenn Sie die Anweisungen befolgt
haben, können Sie jedoch davon ausgehen, dass Sie die Dosis inhaliert
haben und dass die Wirkstoffe in die Lunge gelangt sind.
7. Falls mehr als eine Inhalation verordnet wurde, sind die Schritte 2. bis 6.
zu wiederholen.
8. Schrauben Sie die Schutzkappe nach Gebrauch wieder fest auf (Abb. 4).
9. Spülen Sie Ihren Mund nach Ihren täglichen Inhalationen am Morgen und/
oder am Abend mit Wasser aus und spucken Sie es aus.



(Abb. 3)




(Abb. 4)

Versuchen Sie nicht, das Mundstück zu entfernen oder zu drehen. Das Mund-
stück ist mit Ihrem Symbicort Turbohale-Inhalator fest verbunden und darf
nicht abgenommen werden. Verwenden Sie Ihren Symbicort Turbohale-Inhala-
tor nicht, wenn er beschädigt wurde oder wenn sich das Mundstück von
Ihrem Symbicort Turbohale-Inhalator gelöst hat.

Wie bei allen Inhalatoren sollten die Betreuungspersonen sicherstellen, dass
Kinder, denen Symbicort Turbohale verschrieben wurde, die korrekte, oben
beschriebene Inhalationstechnik anwenden.

Reinigung Ihres Symbicort Turbohale-Inhalators

Reinigen Sie das Mundstück einmal in der Woche äußerlich mit einem trocken-
en Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten.



(Abb. 5)

Wann müssen Sie einen neuen Inhalator verwenden

- Die Dosisanzeige zeigt an, wie viele Dosen (Inhalationen) noch in Ihrem
Symbicort Turbohale-Inhalator vorhanden sind, ausgehend von 60 Dosen,
wenn das Gerät voll ist.
- Die Dosisanzeige ist in Abständen von jeweils 10 Dosen gekennzeichnet.
Sie zeigt daher nicht jede Dosis an.
- Beim Erscheinen einer roten Markierung am Rand der Dosisanzeige sind
noch ca. 20 Dosen übrig. Die letzten 10 Dosen erscheinen auf rotem Hinter-
grund. Wenn die „0“ auf dem roten Hintergrund die Mitte des Anzeigefen-
sters erreicht hat, müssen Sie mit der Anwendung eines neuen Symbicort
Turbohale-Inhalators beginnen (Abb. 5).

Hinweis:

- Das Dosier-
rad lässt sich noch immer drehen und klickt, auch wenn Ihr Sym-
bicort Turbohale-Inhalator leer ist.
- Das Geräusch, das beim Schütteln Ihres Symbicort Turbohale-Inhalators
auftritt, wird durch das Trockenmittel und nicht durch das Arzneimittel

verursacht. Dieses Geräusch gibt keine Auskunft darüber, wie viel
Arzneimittel noch in Ihrem Symbicort Turbohale-Inhalator enthalten ist.

- Auch wenn Sie das Dosier-
rad Ihres Symbicort Turbohale-Inhalators vor der
Anwendung versehentlich mehrfach betätigt haben, wird nur eine Dosis
abgegeben. Die Dosisanzeige erfasst jedoch alle geladenen Dosen.

Wenn Sie eine größere Menge von Symbicort Turbohale angewendet haben, als Sie sollten

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Dosis so anwenden, wie in der Packungsbeilage
angegeben oder gemäß der Anweisung Ihres Arztes. Sie sollten Ihre ver-
schriebene Dosis nicht überschreiten, ohne ärztlichen Rat einzuholen.

Die häufigsten Symptome, die auftreten können, wenn Sie eine größere Men-
ge von Symbicort Turbohale angewendet haben, als Sie sollten, sind Zittern,
Kopfschmerzen oder schneller Herzschlag.

Wenn Sie die Anwendung von Symbicort Turbohale vergessen haben

- Wenn Sie die Inhalation einer Dosis vergessen haben, wenden Sie diese an,
sobald Sie daran denken. Falls es jedoch bald Zeit für Ihre nächste Dosis ist,
lassen Sie die vergessene Dosis aus.
- Wenden Sie **nicht** die doppelte Dosis als Ausgleich für eine vergessene
Dosis an.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wen-
den Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben,
die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn eine der folgenden Nebenwirkungen bei Ihnen auftritt, setzen Sie Symbicort Turbohale ab und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt:

- Schwellungen im Gesicht, insbesondere in der Mundgegend (Zunge und/
oder Hals-Rachen-Bereich und/oder Schluckbeschwerden) oder Ausschlag
zusammen mit Atembeschwerden (Angioödem) und/oder plötzliches Ohn-
machtsgefühl. Dies könnte bedeuten, dass Sie eine allergische Reaktion
haben. Dies geschieht selten, d. h. bei weniger als 1 von 1.000 Patienten.
- Plötzlich auftretendes, akutes, pfeifendes Atemgeräusch oder Kurzatmig-
keit unmittelbar nach der Inhalation. **Wenn eines dieser Symptome bei
Ihnen auftritt, setzen Sie Ihren Symbicort Turbohale ab und ver-
wenden Sie, sofern vorhanden, einen separaten Inhalator für den
Bedarfsfall. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt, da Ihre Be-
handlung gegebenenfalls umgestellt werden muss.** Dies geschieht
sehr selten, d. h. bei weniger als 1 von 10.000 Patienten.

Andere mögliche Nebenwirkungen:

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Patienten betreffen)

- Palpitationen (Herzklopfen), leichtes oder starkes Muskelzittern. Wenn die-
se Nebenwirkungen auftreten, sind sie in der Regel leicht und verschwin-
den gewöhnlich bei Fortsetzung der Behandlung mit Symbicort Turbohale.
- Soor (eine Pilzinfektion) im Mund. Dies ist weniger wahrscheinlich, wenn
Sie den Mund nach Anwendung des Symbicort Turbohales mit Wasser
ausspülen.
- Leichte Reizungen des Rachens, Husten und Heiserkeit
- Kopfschmerzen
- Pneumonie (Lungenentzündung) bei COPD-Patienten

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie während der Anwendung von Symbicort
Turbohale folgende Beschwerden bemerken - dies könnten Symptome einer
Lungenentzündung sein:

- Fieber oder Schüttelfrost
- vermehrte Bildung von Schleim, Farbänderung des Schleims
- stärkerer Husten oder verstärkte Atembeschwerden

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Patienten betreffen)

- Rastlosigkeit, Nervosität, Unruhe
- Schlafstörungen
- Schwindel
- Übelkeit
- Schneller Herzschlag
- Blutergüsse
- Muskelkrämpfe
- Verschwommenes Sehen

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Patienten betreffen)

- Ausschlag, Juckreiz
- Bronchospasmen (Krämpfe der Muskeln in den Atemwegen, die zu einer
pfeifenden Atmung führen). Wenn das Pfeifen plötzlich nach Anwendung
des Symbicort Turbohale einsetzt, wenden Sie Symbicort Turbohale nicht
weiter an und sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt.
- Niedrige Blutkaliumspiegel
- Unregelmäßiger Herzschlag

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Patienten betreffen)

- Depressionen
- Verhaltensänderungen, insbesondere bei Kindern
- Schmerzen oder Engegefühl in der Brust (Angina pectoris)
- Erhöhung der Zuckermenge (Glucose) im Blut
- Geschmacksveränderungen, z. B. ein unangenehmer Geschmack im Mund
- Veränderungen des Blutdrucks

Inhalativ anzuwendende Kortikosteroide können die normale Steroidhormon-
produktion im Organismus beeinflussen, insbesondere, wenn Sie hohe Dosen
über einen längeren Zeitraum anwenden. Zu diesen Effekten zählen:

- Veränderungen der Knochendichte (Abnahme der Knochendichte)
- Katarakt (grauer Star, Trübung der Augenlinse)
- Glaukom (grüner Star, erhöhter Augeninnendruck)
- Verlangsamung der Wachstumsrate bei Kindern und Jugendlichen
- Beeinflussung der Nebennieren (kleine Drüsen an den Nieren)

Das Auftreten dieser Effekte ist bei inhalativ anzuwendenden Glukokortikoi-
den viel unwahrscheinlicher als bei Kortikoidtabletten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder
Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungs-
beilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz,

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de an-
zeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass
mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung
gestellt werden.

5. WIE IST SYMBICORT TURBOHALER AUFZUBEWAHREN?

- Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkar-
ton nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwen-
den. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen
Monats.
- Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen
erforderlich.
- Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen
Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es
nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Symbicort Turbohale 160/4,5 Mikrogramm/Dosis enthält

Die Wirkstoffe sind Budesonid und Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.).
Jede inhalierte Dosis enthält 160 Mikrogramm Budesonid und 4,5 Mikro-
gramm Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.). Dies entspricht einer im Behäl-
nis abgemessenen Dosis von 200 Mikrogramm Budesonid und 6 Mikrogramm
Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.).

Der sonstige Bestandteil ist: Lactose-Monohydrat (welches Milchproteine
enthält).

Wie Symbicort Turbohale 160/4,5 Mikrogramm/Dosis aussieht und Inhalt der Packung

Symbicort Turbohale 160/4,5 Mikrogramm/Dosis ist ein Inhalator, der Ihr
Arzneimittel enthält. Das Pulver zur Inhalation ist weiß. Jeder Inhalator be-
steht aus einem weißen Behälter mit einem roten Dosier-
rad. Das Dosier-
rad trägt zur Identifikation einen Code in Blindenschrift mit der Nummer 6, um
eine Unterscheidung von anderen AstraZeneca-Produkten zur Inhalation zu
ermöglichen.

Symbicort Turbohale 160/4,5 Mikrogramm/Dosis ist in Packungen mit 1
Pulverinhalator mit 60 Einzeldosen, 1 Pulverinhalator mit 120 Einzeldosen,
3 Pulverinhalatoren mit jeweils 60 Einzeldosen und 3 Pulverinhalatoren mit
jeweils 120 Einzeldosen erhältlich.

Hersteller:

AstraZeneca AB
Forskargatan 18
SE-151 85 Södertälje
Schweden

Einfuhr, Umverpackung und Vertrieb:

Medicopharm AG
Stangenreiterstr. 4
83131 Nußdorf am Inn
Deutschland
Tel.: 08034 30 55 7-0
Fax: 08034 30 55 7-20

Das Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirt- schaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien: Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Bulgarien:** Sym-
bicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Dänemark:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Deutschland:** Symbicort Turbohale 160/4,5
Mikrogramm/Dosis Pulver zur Inhalation; **Estland:** Symbicort Turbuha-
ler, 160 µg/4,5 µg; **Finnland:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Frankreich:** Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Griechenland:**
Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Island:** Symbicort Turbu-
hale 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Irland:** Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/
inhalation; **Italien:** Symbicort 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Kroatien:** Symbi-
cort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Lettland:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Litauen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg/inhalation; **Niederlande:**
Symbicort Turbuha-
ler 200 µg/6 µg/inhalation; **Norwegen:** Symbicort
Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/inhalation; **Österreich:** Symbicort Turbohale
160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Polen:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Portugal:** Symbicort Turbuha-
ler 160 µg/4,5 µg/
inhalation; **Luxemburg:** Symbicort Turbohale 160 µg/4,5 µg/inhalation;
Malta: Symbicort Turbohale 200 µg/6 µg