


Gebrauchsinformation



**Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen best-möglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bryocalm® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

- Die Packungsbeilage beinhaltet:**
1. Was ist Bryocalm® und wofür wird es angewendet?
 2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bryocalm® beachten?
 3. Wie ist Bryocalm® einzunehmen?
 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
 5. Wie ist Bryocalm® aufzubewahren?
 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

BRYOCALM®

 WELEDA

Tabletten

Wirkstoff: Presssaft aus Bryophyllum pinnatum, Folium

1. Was ist Bryocalm® und wofür wird es angewendet?
Bryocalm® ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete
Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Anfälligkeit für besondere Formen von funktionellen Störungen und wiederholt auftretenden Entzündungen im Bereich des Stoffwechselsystems; Schmerzzustände bei Schwächung der Lebenskräfte; Unruhe- und seelische Ausnahmezustände und dadurch bedingte Schlafstörungen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Bryocalm® beachten?

Bryocalm® darf nicht angewendet werden,
wenn Sie allergisch gegen

- Bryophyllum (Kalanchoe) oder
- einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile

sind, sowie bei bekanntem AV-Block.


Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden müssen Sie einen Arzt aufsuchen.


Schwangerschaft und Stillzeit
Wie alle Arzneimittel sollte Bryocalm® in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Keine bekannt
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Bryocalm®
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie es erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.





3. Wie ist Bryocalm® einzunehmen?

Nehmen Sie Bryocalm® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Kinder ab 1 Jahr, Jugendliche und Erwachsene 1-2 mal täglich 1 Tablette,
Säuglinge im ersten Lebensjahr 1 mal täglich 1 Tablette einnehmen.

Art der Anwendung

Die Tabletten werden mit etwas Flüssigkeit eingenommen.

Art der Anwendung bei Säuglingen und Kindern bis zu 6 Jahren:

Zur leichteren Einnahme wird die Tablette auf einem Teelöffel mit Wasser zerfallen gelassen und die zerfallene Tablette dem Kind direkt in den Mund gegeben. Der Zerfall der Tablette dauert ca. 3 Minuten. Durch leichtes Bewegen des Teelöffels lässt sich der Zerfall beschleunigen. Eventuell verbleibende feste Rückstände können mit einem sauberen Gegenstand vorsichtig zerstoßen werden.

Dauer der Anwendung

Die Behandlung der Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieses Zeitraumes keine Besserung ein, sollte ein Arzt konsultiert werden. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge von Bryocalm® eingenommen haben, als Sie sollten

Symptome einer Überdosierung sind nicht bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Bryocalm® vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Bryocalm® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Bryocalm® aufzubewahren?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Zusammensetzung

In 1 Tablette sind verarbeitet: Wirkstoff: 100 mg Presssaft aus Bryophyllum pinnatum, Folium.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Calciumbehenat.

Darreichungsform und Packungsgrößen

80 Tabletten, 200 Tabletten

Von den aufgeführten Packungsgrößen sind möglicherweise nicht alle im Handel erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Weleda AG, Möhlerstraße 3-5, D-73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: August 2025

