

Minoxidil Redcare

50 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) - Für Männer

Wirkstoff: Minoxidil



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- ♥ Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- ♥ Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- ♥ Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- ♥ Wenn Sie sich nach 4 Monaten nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Minoxidil Redcare und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Minoxidil Redcare beachten?
3. Wie ist Minoxidil Redcare anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Minoxidil Redcare aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Minoxidil Redcare und wofür wird es angewendet?

Minoxidil Redcare ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut), die den Wirkstoff Minoxidil enthält und zur symptomatischen Behandlung des anlagebedingten Haarausfalls bei Männern im Alter von 18 bis 55 Jahren angewendet wird. Minoxidil Redcare stabilisiert den Verlauf des anlagebedingten Haarausfalls (androgenetische Alopezie) im Tonsurbereich der Kopfhaut bei Männern. Die Behandlung kann somit dem Fortschreiten des anlagebedingten Haarausfalls entgegenwirken. Der Mechanismus, durch den auf die Kopfhaut aufgetragenes Minoxidil und/oder sein Metabolit das Haarwachstum stimuliert, ist noch nicht vollständig geklärt. Es wird jedoch angenommen, dass Minoxidil auf der Ebene der Haarfollikel wirkt, indem es den Blutfluss in der Kopfhaut aufgrund einer lokalen Gefäßerweiterung erhöht. Der zeitliche Beginn und das Ausmaß dieses Effekts können individuell unterschiedlich sein und sind nicht vorhersehbar. Minoxidil Redcare ist zur äußerlichen Anwendung bestimmt und soll nur auf die Kopfhaut aufgetragen werden.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Minoxidil Redcare beachten?

- Minoxidil Redcare darf nicht angewendet werden,**
- ♥ wenn Sie allergisch gegen Minoxidil oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
 - ♥ Wenn Sie eine Frau sind, da gelegentlich Anzeichen von kosmetisch störendem, reversiblen Haarwuchs im Gesicht während der Behandlung auftreten können;
 - ♥ wenn Sie andere Arzneimittel auf der Kopfhaut anwenden;
 - ♥ wenn Sie einen Verband oder eine Bandage auf der Kopfhaut haben;
 - ♥ wenn Sie an plötzlichem oder ungleichmäßigem Haarausfall leiden;
 - ♥ wenn Sie eine Erkrankung haben, die Ihre Kopfhaut betrifft, einschließlich Psoriasis (eine juckende, entzündliche Hauterkrankung), Sonnenbrand, rasierte Kopfhaut oder wenn Ihre Kopfhaut durch Narben oder Verbrennungen beschädigt ist, da dort keine Haarwurzeln vorhanden sind;
 - ♥ wenn Sie Anzeichen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herzrhythmusstörungen haben, wie koronare Herzkrankheit, Arrhythmien, kongestive Herzinsuffizienz oder Klappenerkrankungen;
 - ♥ wenn Sie unter Bluthochdruck (Hypertonie) leiden;
 - ♥ wenn Sie Arzneimittel zur Behandlung von Bluthochdruck einnehmen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Tragen Sie Minoxidil Redcare nur auf eine normale, gesunde Kopfhaut auf. Verwenden Sie Minoxidil Redcare nicht, wenn die Ursache des Haarausfalls nicht bekannt ist oder wenn die Kopfhaut rot, entzündet oder schmerzhaft ist. Bisher gibt es keine klinischen Erfahrungen bezüglich der Wirksamkeit bei Haarausfall im Schläfenbereich. Minoxidil Redcare ist nur zur äußerlichen Anwendung auf der Kopfhaut bestimmt. Wenden Sie Minoxidil Redcare nicht auf anderen Körperteilen an. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Herzrhythmusstörung wie Herzrasen, Brustschmerzen, Bewusstseinsverlust, Schwindel, unerklärliche Gewichtszunahme oder Anzeichen einer Flüssigkeitsansammlung (Schwellung der Hände oder Füße) leiden oder gelitten haben. In diesen Fällen dürfen Sie dieses Arzneimittel nicht verwenden (siehe Abschnitt „Minoxidil Redcare darf nicht angewendet werden“). Patienten mit niedrigem Blutdruck sollten vor der Anwendung von Minoxidil einen Arzt kontaktieren, und es sollte zu Beginn und regelmäßig während der Behandlung eine Überwachung erfolgen. Sie müssen die Anwendung von Minoxidil Redcare beenden und einen Arzt aufsuchen:

- ♥ wenn bei Ihnen niedriger Blutdruck festgestellt wird;
- ♥ wenn Sie hohen Blutdruck haben;
- ♥ wenn Sie Arzneimittel zur Behandlung von hohem Blutdruck einnehmen;
- ♥ wenn eines oder mehrere der folgenden Symptome auftreten: Brustschmerzen, beschleunigter Herzschlag, Schwäche oder Schwindel, plötzliche und unerklärliche Gewichtszunahme, geschwollene Hände oder Füße, anhaltende Rötung oder Reizung der Kopfhaut oder wenn andere unerwartete neue Symptome auftreten (siehe Abschnitt „Wenn Sie eine größere Menge von Minoxidil Redcare angewendet haben, als Sie sollten“).

Unerwünschter Haarwuchs kann durch den Transfer des Produkts auf andere Körperstellen als die Kopfhaut verursacht werden. Bei Kleinkindern wurden Fälle von übermäßigem Haarwuchs am Körper nach Hautkontakt mit Minoxidil-Anwendungsstellen von Patienten (Betreuungspersonen), die topisches Minoxidil anwenden, berichtet. Das Haarwachstum normalisierte sich innerhalb von Monaten, wenn die Kleinkinder nicht mehr mit Minoxidil in Kontakt kamen. Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mit Körperstellen in Berührung kommen, an denen Sie Minoxidil aufgetragen haben.

Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie während der Anwendung von topischen minoxidilhaltigen Arzneimitteln übermäßigen Haarwuchs am Körper Ihres Kindes feststellen. In Einzelfällen wurden leichte Farbveränderungen des Haares bei Patienten mit sehr hellem Haar berichtet, die gleichzeitig Haarpflegeprodukte verwendeten oder nach dem Schwimmen in stark chloriertem Wasser.

Unabsichtliche Einnahme kann schwerwiegende Nebenwirkungen auf das Herz-Kreislauf-System verursachen. Bewahren Sie dieses Arzneimittel daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vermeiden Sie das Einatmen des Sprühnebels.

Da Minoxidil Redcare Alkohol und Propylenglycol enthält, kann es bei versehentlichem Kontakt mit empfindlichen Bereichen (Augen, Schleimhäuten, verletzter Haut) ein Brennen und/oder Reizungen verursachen. In diesen Fällen muss der betroffene Bereich gründlich mit ausreichend fließendem Wasser gespült werden. Sollte das Brennen und/oder die Reizung anhalten, ist ein Arzt zu kontaktieren.

Kinder und Jugendliche

Wenden Sie dieses Arzneimittel nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren an, da Sicherheit und Wirksamkeit in dieser Altersgruppe nicht festgestellt wurden.

Anwendung von Minoxidil Redcare zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden, kürzlich eingenommen/ angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/ anzuwenden. Bisher liegen keine Informationen zu Wechselwirkungen zwischen Minoxidil Redcare und anderen Arzneimitteln vor. Obwohl nicht klinisch nachgewiesen, besteht eine theoretische Möglichkeit, dass die Aufnahme des Wirkstoffs in Minoxidil Redcare (Minoxidil) in den Körper bei Patienten, die gleichzeitig periphere Vasodilatoren (bestimmte Arzneimittel gegen Bluthochdruck, die die Blutgefäße erweitern) einnehmen, den orthostatischen Blutdruckabfall (ein Blutdruckabfall, der beim Aufstehen aus liegender Position auftritt) verschlimmern könnte. Minoxidil Redcare darf nicht zusammen mit anderen dermatologischen Produkten (Arzneimittel für die äußerliche Anwendung, die Wirkstoffe wie Kortikosteroide, Retinoide oder Anthralin enthalten) oder mit Mitteln, die die Aufnahme des Wirkstoffs durch die Haut erhöhen, angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Minoxidil darf nur von Männern angewendet werden. Es liegen nur begrenzte Erfahrungen mit der Anwendung von Minoxidil Redcare während der Schwangerschaft vor. Daher darf Minoxidil Redcare von schwangeren Frauen nicht angewendet werden. Wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Minoxidil, das in den Körper aufgenommen wird, kann in die Muttermilch übergehen. Daher darf Minoxidil Redcare von stillenden Müttern nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel kann Schwindel oder Veränderungen des Blutdrucks verursachen. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, führen Sie kein Fahrzeug und bedienen Sie keine Maschinen.

Minoxidil Redcare enthält Propylenglycol

Dieses Arzneimittel enthält 350 mg Propylenglycol pro ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut). Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

Minoxidil Redcare enthält Ethanol (96 %)

Dieses Arzneimittel enthält 510 mg Alkohol (Ethanol) pro ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut). Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen. Ethanol kann ein Stechen und Reizungen in den Augen verursachen. Bei versehentlichem Kontakt mit empfindlichen Bereichen (Augen, Hautabschürfungen, Schleimhäuten) müssen diese gründlich mit ausreichend Wasser gespült werden.

3. Wie ist Minoxidil Redcare anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Minoxidil Redcare ist zur äußerlichen Anwendung auf der trockenen Kopfhaut bestimmt. Verwenden Sie Minoxidil Redcare nur auf gesunder, unbeschädigter Kopfhaut und befolgen Sie stets genau die unten angegebenen Anweisungen. Tragen Sie Minoxidil Redcare nicht auf andere Körperbereiche als die Kopfhaut auf.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Sofern der Arzt nicht anders verordnet, ist Minoxidil Redcare wie folgt anzuwenden:

Tragen Sie 1 ml der Minoxidil Redcare Lösung zweimal täglich, alle 12 Stunden (morgens und abends), auf die betroffene Stelle der Kopfhaut auf, indem Sie den Sprühkopf 6 mal betätigen. Tragen Sie die Lösung auf die Mitte des betroffenen Bereichs auf und verteilen Sie sie mit den Fingerspitzen, um sicherzustellen, dass das Arzneimittel gleichmäßig verteilt wird. Für eine gezieltere Anwendung verwenden Sie den mitgelieferten Applikator. Entfernen Sie dazu den oberen Teil des Sprühkopfes durch Hochziehen und setzen Sie den Applikator mit verlängerter Spitze auf. Drücken Sie dann den Applikator 6 mal, wie oben für den Sprühkopf angegeben. Waschen Sie Ihre Hände nach jeder Anwendung gründlich. Die täglich angewendete Menge von 2-mal 1 ml Lösung soll unabhängig von der Größe der betroffenen Kopfhautfläche nicht überschritten werden.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Minoxidil Redcare soll nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren angewendet werden, da keine Ergebnisse zu Wirksamkeit und Sicherheit aus kontrollierten Studien für diese Altersgruppen vorliegen.

Art der Anwendung

Anwendung auf der Haut (Kopfhaut). Minoxidil Redcare ist nur zur äußerlichen Anwendung und ausschließlich auf der Kopfhaut bestimmt. Jede Packung von Minoxidil Redcare enthält 2 verschiedene Applikatoren:

- ♥ vormontierte Sprühpumpe für die großflächige Anwendung
- ♥ einen gesondert beiliegenden Applikator mit verlängerter Spitze für kleinere Flächen

Beide Applikatoren können durch Abziehen des einen Applikators und Aufsetzen des anderen Applikators gewechselt werden.

Für die Dosis von 1ml werden 6 Sprühstöße benötigt.

Anweisungen zur Anwendung

Möglichkeit 1 – Sprühpumpe

- 1. Dieser Applikator ist besonders für die großflächige Anwendung auf der Kopfhaut geeignet.
- 2. Die Schutzkappe von der Flasche entfernen.
- 3. Um 1 ml Lösung anzuwenden, die Sprühpumpe 6-mal drücken. Die Lösung mit den Fingerspitzen verteilen, um sicherzustellen, dass das Arzneimittel gleichmäßig aufgetragen wird.
- 4. Danach die Hände und andere Regionen als die Kopfhaut, die mit Minoxidil Redcare in Kontakt gekommen sind, sofort gründlich waschen.

Möglichkeit 2 – Applikator mit verlängerter Spitze

- 1. Dieser Applikator ist besonders geeignet für kleine Flächen auf der Kopfhaut oder an den unteren Haaren.
- 2. Die Schutzkappe von der Flasche entfernen.
- 3. Den oberen Teil des Sprühkopfes (Teil mit der Öffnung) durch Hochziehen entfernen und den Applikator mit verlängerter Spitze aufsetzen.
- 4. Um 1ml Lösung anzuwenden den Applikator 6-mal betätigen. Die Lösung mit den Fingerspitzen verteilen, um sicherzustellen, dass das Arzneimittel gleichmäßig aufgetragen wird.
- 5. Danach die Hände und andere Regionen als die Kopfhaut, die mit Minoxidil Redcare in Kontakt gekommen sind, sofort gründlich waschen.

Reinigung des Sprühkopfes und Applikators

Nehmen Sie den oberen Teil vom Sprühkopf oder Applikator nach jedem Gebrauch ab und spülen Sie diesen mit 70 %igem Isopropylalkohol aus, um Arzneimittelrückstände zu beseitigen und eine Verklebung zu vermeiden.

Was müssen Sie sonst noch bei der Anwendung beachten?

Waschen Sie Ihre Hände gründlich, nachdem Sie Minoxidil Redcare aufgetragen haben, um versehentlichen Kontakt mit Schleimhäuten und Augen zu vermeiden.

Nach der Anwendung von Minoxidil Redcare können Sie Ihr Haar wie gewohnt stylen. Achten Sie jedoch darauf, die Kopfhaut für etwa 4 Stunden nicht zu befeuchten. Dies verhindert, dass Minoxidil Redcare abgewaschen wird.

Dauer der Anwendung

Der zeitliche Beginn und das Ausmaß des Haarwachstums sind bei einzelnen Patienten unterschiedlich. In der Regel ist eine Behandlung zweimal täglich über 2 bis 4 Monate erforderlich, bevor eine Wirkung erkennbar wird. Um die Wirkung aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, die zweimal tägliche Anwendung ohne Unterbrechung fortzusetzen. Es wird kein besseres Ergebnis erzielt, wenn Minoxidil Redcare in größeren Mengen oder häufiger angewendet wird. Es liegen ausreichende klinische Erfahrungen für eine Behandlungsdauer von bis zu einem Jahr vor.

Wenn nach 4 Monaten keine Wirkung zu sehen ist, sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Information über erhöhten Haarausfall

Während der Behandlung der Haarfollikel mit dem Wirkstoff Minoxidil, wird die Ruhephase (Telogenphase) des Haarwachszyklusses verkürzt und dadurch die Wachstumsphase (Anagenphase) schneller erreicht. Dieses stimuliert neues Haarwachstum, dass die „alten“, nicht mehr aktiven Haare aus der Kopfhaut schiebt. Dies führt zu dem Eindruck eines erhöhten Haarausfalls. Bei manchen Patienten wurde diese Reaktion zwei bis sechs Wochen nach Beginn der Therapie beobachtet. Dennoch wuchs gleichzeitig neues Haar, sodass kein Grund zur Sorge besteht. Dieser Effekt lässt nach ein paar Wochen nach und kann als erstes Zeichen des Minoxidil-Effektes interpretiert werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Minoxidil Redcare angewendet haben, als Sie sollten

Die Anwendung von Minoxidil Redcare in höherer als der empfohlenen Dosis und auf relativ großen Körperflächen oder anderen Bereichen als der Kopfhaut kann möglicherweise zu einer erhöhten Aufnahme von Minoxidil in den Körper führen. Bis heute sind keine bekannten Fälle aufgetreten, in denen die äußerliche Anwendung der Minoxidil-Lösung zu Vergiftungserscheinungen geführt hat. Nach versehentlichem Verschlucken kann die Konzentration des Wirkstoffs Minoxidil in Minoxidil Redcare zu Auswirkungen auf die inneren Organe führen, die den Effekten entsprechen, die auftreten, wenn der Wirkstoff, z.B. in Tablettenform, geschluckt wird. Dies kann folgende Nebenwirkungen verursachen: beschleunigter Herzschlag, Blutdruckabfall, Flüssigkeitsansammlungen und daraufhin plötzliche Gewichtszunahme, Schwindel.

Im Falle einer versehentlichen Einnahme oder Anzeichen einer Überdosierung informieren Sie bitte sofort einen Arzt, damit dieser entscheiden kann, wie weiter verfahren wird. Halten Sie die Arzneimittelpackung bereit, damit der Arzt über den eingenommenen Wirkstoff informiert werden kann.

Wenn Sie die Anwendung von Minoxidil Redcare vergessen haben

Verwenden Sie keine doppelte Dosis, um eine vergessene Dosis auszugleichen; setzen Sie Ihre Behandlung mit der empfohlenen Dosis fort. Das Nachholen der versäumten Dosis bringt keinen zusätzlichen Nutzen und kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.

Wenn Sie die Anwendung von Minoxidil Redcare abbrechen

Es ist notwendig, die Behandlung fortzusetzen, um das Haarwachstum zu verbessern und aufrechtzuerhalten. Andernfalls wird der Haarausfall wieder auftreten.

Wenn die Behandlung innerhalb von 3 bis 4 Monaten unterbrochen wird, stellt sich ein Zustand ein, wie er ohne die Behandlung mit Minoxidil Redcare erreicht worden wäre. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Kontaktieren Sie sofort einen Arzt, wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken – Sie könnten dringend medizinische Behandlung benötigen:

- ♥ Schwellung im Gesicht, an den Lippen oder im Rachen, die das Schlucken oder Atmen erschwert. Dies könnte ein Zeichen für eine schwere allergische Reaktion sein (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).
- ♥ Allgemeine Rötung der Haut (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).
- ♥ Allgemeiner Juckreiz (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).
- ♥ Engegefühl im Hals (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen)

- ♥ Kopfschmerzen

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

- ♥ Juckreiz
- ♥ Erhöhter Haarwuchs außerhalb der Kopfhaut (einschließlich Gesichtsbehaarung bei Frauen), entzündliche Hautreaktionen (einschließlich akneähnlichem Hautausschlag, Hautausschlag)
- ♥ Kurzatmigkeit, Atembeschwerden
- ♥ Schwellung von Armen und Beinen
- ♥ Gewichtszunahme
- ♥ Bluthochdruck
- ♥ Reizungen der Kopfhaut wie Stechen, Brennen, Trockenheit, Juckreiz, Schuppenbildung, Haarbalgentzündung

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)

- ♥ Schwindel, Übelkeit

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

- ♥ Kontaktdermatitis (allergiebedingte Hautentzündung)
- ♥ Depressive Verstimmung
- ♥ Augenreizungen
- ♥ Beschleunigter Herzschlag, Herzklopfen, niedriger Blutdruck
- ♥ Erbrechen
- ♥ Symptome an der Anwendungsstelle, die auch Ohren und Gesicht betreffen können, wie Juckreiz, Hautreizungen, Schmerzen, Rötung, Schwellung, trockene Haut und entzündlicher Hautausschlag bis hin zu möglichem Hautabschälen, Hautentzündungen (Dermatitis), Blasenbildung, Blutungen und Geschwüren
- ♥ Vorübergehender Haarausfall, Veränderungen der Haarfarbe, veränderte Haarstruktur
- ♥ Brustschmerzen

Meldung von Nebenwirkungen

Deutschland:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Österreich:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, Österreich, Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at> anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Minoxidil Redcare aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton oder der Flasche nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Halten Sie die Flasche gut verschlossen.

Halbbarkeit nach Anbruch: 12 Monate.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Deutschland: Weitere Informationen finden sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Minoxidil Redcare 50 mg /ml Lösung enthält

- ♥ Der Wirkstoff ist Minoxidil. 1ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) enthält 50 mg Minoxidil.
- ♥ Die sonstigen Bestandteile sind: Propylenglycol und Ethanol (96%).

Wie Minoxidil Redcare aussieht und Inhalt der Packung

Klare, farblos bis gelbliche, homogene Lösung, frei von Partikeln in Suspension.

Minoxidil Redcare ist in Flaschen mit 60ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) erhältlich (Flasche mit Sprühpumpe und einem Applikator).

Packungsgrößen:

1x 60ml und 3x 60ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut).

Nicht alle Packungsgrößen sind möglicherweise im Handel erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

RC Pharma B.V.
Erik de Rodeweg 11
5975 WD Sevenum
Niederlande

Hersteller:
Medinfar Manufacturing, S.A.
Rua do Outeiro da Armada, n.º5 - Parque Industrial Armando Martins Tavares
3150-194 CONDEIXA-A-NOVA
Portugal

Österreich: Z.Nr.: 143159

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien:	FR: Minoxidil Leman 50 mg / ml Solution pour application cutanée NL: Minoxidil Leman 50 mg / ml Oplossing voor cutaan gebruik DE: Minoxidil Leman 50 mg / ml Lösung zur Anwendung auf der Haut
Deutschland:	Minoxidil Redcare 50 mg / ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut)
Italien:	SCEVADIL
Luxemburg:	Minoxidil Leman 50 mg / ml Solution pour application cutanée
Österreich:	Minoxidil Redcare 50 mg / ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut)
Polen:	Minoxidil Medinfar
Portugal:	Noage
Rumänien:	Minoxidil Medinfar
Spanien:	Minoxidil GalenciumDerma 50 mg / ml solución cutánea

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2026.