



Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten beachten?
3. Wie sind Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten und wofür werden sie angewendet?

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten enthalten den Wirkstoff Finasterid.

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten sind nur zur Behandlung von Männern vorgesehen.

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten werden zur Behandlung des Haarausfalls vom männlichen Typ (auch als androgenetische Alopezie bezeichnet) bei Männern im Alter von 18 bis 41 Jahren angewendet. Wenn Sie nach dem Lesen dieser Gebrauchsinformation noch weitere Fragen zum Haarausfall bei Männern haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Haarausfall vom männlichen Typ ist eine häufige Störung, die wahrscheinlich durch eine Kombination aus erblichen Faktoren und einem bestimmten Hormon namens Dihydrotestosteron (DHT) verursacht wird. DHT trägt zur Verkürzung der Wachstumsphase der Haare und zu deren Ausdünnung bei.

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten senken in der Kopfhaut spezifisch die DHT-Spiegel, indem sie ein Enzym (Typ II 5-alpha-Reduktase) hemmen, welches Testosteron zu DHT umwandelt. Nur Männer mit leichtem bis mäßigem Haarausfall, nicht aber solche mit vollständigem Haarverlust, können von der Behandlung mit Finasterid Careforsons 1 mg

Filmtabletten eine Besserung erwarten. Bei den meisten Männern, die 5 Jahre lang mit Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten behandelt wurden, verlangsamte sich das Fortschreiten des Haarausfalls, und bei mindestens der Hälfte dieser Männer verbesserte sich auch das Haarwachstum zu einem gewissen Grad.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten beachten?

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten dürfen nicht eingenommen werden:

- wenn Sie eine Frau sind (weil dieses Arzneimittel nur für Männer bestimmt ist, siehe Abschnitt „Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit“). Klinische Studien haben gezeigt, dass Finasterid bei Frauen mit Haarausfall nicht wirksam ist.
- wenn Sie allergisch gegen Finasterid oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten einnehmen.

Wirkungen auf das prostataspezifische Antigen (PSA)

Finasterid kann Untersuchungen auf das prostataspezifische Antigen im Blut (PSA-Test) beeinflussen, die im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung auf Prostatakrebs durchgeführt werden. Wenn

bei Ihnen ein PSA-Test durchgeführt werden soll, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker darüber informieren, dass Sie Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten einnehmen, da Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten den PSA-Spiegel senken.

Auswirkungen auf die Fertilität

Unfruchtbarkeit wurde bei Männern berichtet, die Finasterid lange Zeit einnahmen und bei denen andere Risikofaktoren vorlagen, welche die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Nach Absetzen von Finasterid wurde über eine Normalisierung oder Verbesserung der Spermienqualität berichtet. Klinische Langzeitstudien über die Auswirkungen von Finasterid auf die Fruchtbarkeit bei Männern wurden nicht durchgeführt.

Brustkrebs

Siehe Abschnitt 4.

Stimmungsänderungen und Depression

Bei Patienten, die mit Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten behandelt wurden, wurde über Stimmungsänderungen wie depressive Verstimmung, Depression und seltener Selbstmordgedanken berichtet. Sollten Sie eines dieser Symptome bei sich feststellen, brechen Sie die Einnahme von Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten ab und fragen Sie unverzüglich Ihren Arzt um Rat.

Kinder und Jugendliche

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten dürfen nicht bei Kindern angewendet werden. Es liegen keine Daten zum Beleg

der Wirksamkeit und Sicherheit von Finasterid bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren vor.

Einnahme von Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/ angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/ anzuwenden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten sind nur zur Behandlung des Haarausfalls vom männlichen Typ bei Männern bestimmt. Zu Auswirkungen auf die Zeugungsfähigkeit bei Männern siehe Abschnitt 2.

- **Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten dürfen von Frauen nicht angewendet werden, da in der Schwangerschaft ein Risiko besteht.**

- **Berühren Sie verkleinerte oder zerbrochene Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten nicht, wenn Sie schwanger sind oder sein könnten.**
- Wenn Finasterid Careforsons durch Einnahme oder über die Haut von einer schwangeren Frau aufgenommen wird, die ein männliches Kind erwartet, kann es bei dem Kind zu Fehlbildungen der Geschlechtsorgane kommen.

- Wenn eine schwangere Frau mit Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten in Berührung kommt, sollte sie sich an einen Arzt wenden.
- Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten sind mit einem Film überzogen, der während der üblichen Handhabung einen Kontakt mit dem Wirkstoff verhindert.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigen.

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten enthalten Lactose

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Natriumgehalt

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Filmtablette und ist damit praktisch „natriumfrei“.

3. Wie sind Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten einzunehmen?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt eine Tablette einmal täglich. Die Tabletten können mit den Mahlzeiten oder unabhängig davon

eingenommen werden.

Ihr Arzt wird Ihnen bei der Beurteilung helfen, ob Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten bei Ihnen wirken. Es ist wichtig, dass Sie Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten so lange einnehmen wie vom Arzt verordnet. Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten können nur langfristig wirken, wenn Sie sie fortlaufend einnehmen.

Wenn Sie eine größere Menge von Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich zu viele Tabletten eingenommen haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt. Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten werden weder besser noch schneller wirken, wenn Sie sie mehrmals täglich einnehmen.

Wenn Sie die Einnahme von Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die vergessene Einnahme auszugleichen.

Wenn Sie die Einnahme von Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten abbrechen

Es kann eine Behandlung über 3 bis 6 Monate erforderlich sein, bis sich die volle Wirkung entwickelt. Es ist wichtig, dass Sie Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten so lange einnehmen wie vom Arzt verordnet. Wenn Sie die Behandlung mit Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten abbrechen, werden Sie das durch die Behandlung gewonnene Haar vermutlich innerhalb von 9 bis 12 Monaten wieder verlieren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Die Nebenwirkungen waren während der Behandlung gewöhnlich vorübergehend oder verschwanden nach Abbruch der Behandlung.

Nehmen Sie Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten nicht weiter ein und wenden Sie sich sofort an einen Arzt, wenn irgendwelche der folgenden Beschwerden bei Ihnen auftreten:

- Schwellung von Lippen, Gesicht, Zunge oder Rachen, Schluckbeschwerden, Quaddelbildung (Nesselsucht) und Atembeschwerden.

Informieren Sie Ihren Arzt unverzüglich über jegliche Veränderungen in Ihrem Brustgewebe wie Knoten, Schmerzen, Brustvergrößerung oder Ausfluss aus den Brustwarzen, da dies Anzeichen einer schwerwiegenden Erkrankung wie Brustkrebs sein können.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

- verringertes sexuelles Verlangen
- Erektionsstörungen
- Ejakulationsstörungen wie z. B. verminderte Samenergussmenge
- Depression

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

- allergische Reaktionen wie Ausschlag und Juckreiz
- Schwellung oder Berührungsempfindlichkeit der Brust

- Hodenschmerzen
- Blut im Samen
- schneller Herzschlag
- Erektionsstörungen, die nach dem Absetzen der Behandlung andauern
- Verringerung des sexuellen Verlangens, die nach dem Absetzen der Behandlung andauert
- Unfruchtbarkeit bei Männern und/oder Abnahme der Samenqualität
- erhöhte Leberenzyme
- Angst

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Careforsons 1 mg Filmtabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterverpackung nach „Verwendbar bis“ bzw. „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Careforsons 1 mg Filmtabletten enthalten

Der Wirkstoff ist Finasterid. Jede Filmtablette enthält 1 mg Finasterid. Die sonstigen Bestandteile sind:

- Tablettenkern: Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Maisstärke, Docusat-Natrium, Eisenoxid gelb (E172), Natriumstärkeglykolat (Typ A), mikrokristalline Cellulose, hochdisperses wasserfreies Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, gereinigtes Wasser.
- Tablettenüberzug: Hydroxypropylcellulose, Hypromellose, Talk, Titandioxid (E171), Eisenoxid rot (E172), Eisenoxid gelb (E172).

Wie Careforsons 1 mg Filmtabletten aussehen und Inhalt der Packung

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten sind runde, beidseitig gewölbte, rote Filmtabletten mit einem Nenndurchmesser von 6,5 mm.

Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten sind in weißen PVC/PE/PVDC/Aluminium- und/oder Aluminium-Bliesterpackungen erhältlich. Die Bliesterpackungen sind in Kartons mit 14, 20, 28, 30, 50, 60 oder 100 Filmtabletten verpackt.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer
Careforsons Ireland Limited
New Cork Road
Bandon, Co. Cork
Ireland

Hersteller

Genepharm S.A.
15351 Marathon Avenue
15351 Pallini Attikis
Griechenland

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im
November 2022.



Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Minoxidil Careforsons für Männer 50 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw.

genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Minoxidil Careforsons für Männer und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Minoxidil Careforsons für Männer beachten?
3. Wie ist Minoxidil Careforsons für Männer anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Minoxidil Careforsons für Männer aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Minoxidil Careforsons für Männer und wofür wird es angewendet?

Minoxidil Careforsons für Männer ist ein

Arzneimittel zum Auftragen auf die Kopfhaut; es stimuliert das Haarwachstum bei Männern im Alter von 18 - 65 Jahren mit männlichem Haarausfall (androgenetische Alopezie).

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Minoxidil Careforsons für Männer beachten?

Minoxidil Careforsons für Männer darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Minoxidil oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- wenn Sie eine Frau sind,
- wenn Sie einen hohen Blutdruck haben (dies gilt auch dann, wenn dieser behandelt wird),
- wenn Ihre Kopfhaut entzündet, infiziert oder gereizt ist oder schmerzt,
- wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die Ihre Kopfhaut beeinträchtigt, einschließlich Sonnenbrand und Psoriasis,
- wenn Sie sich die Kopfhaut rasieren haben,
- wenn auf Ihrer Kopfhaut ein Pflaster oder eine Bandage angebracht ist.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie die Behandlung mit Minoxidil Careforsons für Männer starten, müssen Sie von Ihrem Arzt gründlich untersucht werden. Bitte sprechen Sie in den folgenden Fällen mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Minoxidil Careforsons für Männer anwenden:

- wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Kopfhaut normal und gesund ist,
- wenn Sie an einer Herzerkrankung leiden, z. B. Herzrhythmusstörungen und unregelmäßiger Herzschlag, Angina oder Schmerzen im Brustkorb und/oder Kreislaufstörungen.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn während der Anwendung von Minoxidil Careforsons für Männer eine der folgenden Situationen auftritt: geringer Blutdruck, Schmerzen im Brustkorb, schneller Herzschlag, Schwächeanfall oder Schwindel, plötzliche Gewichtszunahme, geschwollene Hände oder Füße oder anhaltende Rötung bzw. Reizung der Kopfhaut.

Bei Kleinkindern wurden Fälle von übermäßigem Haarwuchs am Körper nach Hautkontakt mit Minoxidil-Anwendungsstellen von Patienten (Betreuungspersonen), die topisches Minoxidil anwenden, berichtet. Das Haarwachstum normalisierte sich innerhalb von Monaten, wenn die Kleinkinder nicht mehr mit Minoxidil in Kontakt kamen. Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mit Körperstellen in Berührung kommen, an denen Sie Minoxidil aufgetragen haben. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie während der Anwendung von topischen minoxidilhaltigen Arzneimitteln übermäßigen Haarwuchs am Körper Ihres Kindes feststellen.

Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Arzneimittel und Augen, Mund, verletzter Haut sowie empfindlichen Körperstellen. Falls die Lösung versehentlich auf Bereiche außerhalb der Kopfhaut aufgetragen wird, waschen Sie die betreffenden Stellen mit reichlich Wasser ab. Sprechen Sie bei Bedarf mit Ihrem Arzt.

Der behandelte Bereich darf keinem Sonnenlicht und keinen UV-Lampen (UVA-Licht) ausgesetzt und muss besonders geschützt werden.

Achtung: Lösung und Sprühnebel sind entflammbar. Von Hitze, Funken, offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten. Während der Anwendung nicht rauchen. Flasche und Inhalt während der Anwendung, Lagerung und Entsorgung keinen offenen Flammen aussetzen. Flasche dicht geschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort lagern.

Anwendung von Minoxidil Careforsons für Männer zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen bzw. angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen bzw. anzuwenden. Dies gilt insbesondere für verschreibungspflichtige Arzneimittel, wie zum Beispiel:

- Betamethasondipropionat (ein Corticosteroid zur Behandlung von Hautkrankheiten),
- Tretinoin (zur Behandlung von Akne),
- Anthralin (zur Behandlung von Psoriasis),
- Guanethidin (zur Behandlung von hohem Blutdruck).

Minoxidil Careforsons für Männer Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) darf nicht zusammen mit anderen auf die Kopfhaut aufzutragenden Arzneimitteln angewendet werden.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Minoxidil Careforsons für Männer ist nur für Männer vorgesehen und darf bei Frauen nicht angewendet werden. Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie

schwanger sind oder stillen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Minoxidil Careforsons für Männer kann Schwindel und niedrigen Blutdruck verursachen. Falls diese Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten, dürfen Sie kein Fahrzeug führen und keine Maschinen bedienen.

Minoxidil Careforsons für Männer enthält Propylenglycol.

Dieses Arzneimittel enthält 520 mg Propylenglycol pro ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut).

Minoxidil Careforsons für Männer enthält Ethanol (Alkohol).

Dieses Arzneimittel enthält 243 mg Alkohol (Ethanol) pro ml Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut). Bei geschädigter Haut kann es ein brennendes Gefühl hervorrufen.

3. Wie ist Minoxidil Careforsons für Männer anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Ihr Arzt bestimmt für Sie die geeignete Dosis Minoxidil Careforsons für Männer und die Behandlungsdauer.

Minoxidil Careforsons für Männer ist ausschließlich zum Auftragen auf die Haut vorgesehen. Dieses Arzneimittel darf nicht eingenommen werden. Es darf nur direkt auf der Kopfhaut angewendet werden.

Dieses Arzneimittel darf nur auf gesunder

Kopfhaut und nicht auf andere Körperstellen aufgetragen werden. Es darf nicht auf entzündeter, infizierter, gereizter oder schmerzender Kopfhaut angewendet werden.

Tägliche Dosis für erwachsene Männer im Alter von 18 - 65 Jahren

Die empfohlene Tagesdosis beträgt 1 ml Lösung zweimal täglich (10 Sprühstöße mittels Dosierpumpe entsprechen 1 ml Lösung).

Unabhängig vom Ausmaß des Haarausfalls darf stets nur die empfohlene Tagesdosis angewendet werden.

- Vor dem ersten Gebrauch die Schutzkappe von der Flasche abschrauben und durch die Dosierpumpe ersetzen. Die Dosierpumpe gut festschrauben.
- Vor der Anwendung Hände gründlich mit Wasser waschen.
- Haare und Kopfhaut müssen vor der Anwendung vollkommen trocken sein.
- Eine 1 ml-Dosis (10 Sprühstöße mittels Dosierpumpe) auf den gesamten Bereich auftragen und dabei von der Mitte des zu behandelnden Bereichs beginnen.
- Lösung mit Fingerspitzen sanft in die Kopfhaut einmassieren.
- Nach der Anwendung von der Lösung Hände gründlich mit Wasser waschen.



Falls die Lösung versehentlich mit Körperstellen außerhalb der Kopfhaut in

Kontakt kommt, betroffene Bereiche mit reichlich Wasser abwaschen.

Fortlaufende Behandlung mit Minoxidil Careforsons für Männer Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut)

Dieses Arzneimittel muss in der Regel mindestens zwei Monate lang zweimal täglich angewendet werden, bevor sich neuer Haarwuchs einstellt, da das Haarwachstum ein langsamer Prozess ist.

Neu wachsende Haare können zunächst weich und flaumig sein, nehmen aber im Laufe der Zeit normalerweise dieselbe Form an wie normales Haar. Nach dem Absetzen dieses Arzneimittels können neue Haare 3–4 Monate später wieder ausfallen und die Glatzenbildung bzw. der Haarausfall sich fortsetzen. Die fortlaufende Behandlung ist nötig, um das Wachstum neuer Haare zu fördern und aufrechtzuerhalten, da der Haarausfall sonst wieder anfängt.

Falls sich der Haarwuchs nach 4 Monaten nicht bessert, sollte die Behandlung abgesetzt werden.

Wenn Ihnen während der Behandlung etwas Sore bereitet, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Anwendung bei Frauen

Minoxidil Careforsons für Männer darf bei Frauen nicht angewendet werden.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Minoxidil Careforsons für Männer darf bei Patienten unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung bei Patienten über 65 Jahren

Minoxidil Careforsons für Männer darf bei Patienten über 65 Jahren nicht angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Minoxidil

Careforsons für Männer angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge Minoxidil Careforsons für Männer angewendet haben, als Sie sollten, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Arzt oder Apotheker.

Eine versehentliche oder beabsichtigte Überdosis nach der Anwendung von Minoxidil kann hautbezogene Nebenwirkungen verstärken, insbesondere Juckreiz (Pruritus), Trockenheit, Reizung und Ekzem (akute oder chronische entzündliche Hautkrankheit).

Eine versehentliche Einnahme kann schwerwiegende Herzprobleme verursachen. Anzeichen und Symptome einer versehentlichen oder beabsichtigten Einnahme von Minoxidil umfassen u. a. niedrigen Blutdruck (Hypotonie), Herzrasen (Tachykardie), Schwellungen bzw. Flüssigkeitsansammlungen (Ödeme) und Herzversagen (kongestive Herzinsuffizienz).

Wenn Sie die Anwendung von Minoxidil

Careforsons für Männer vergessen haben
Zu Beginn der Behandlung: Tragen Sie die vergessene Dosis so bald wie möglich auf und folgen Sie anschließend den Empfehlungen Ihres Arztes. Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Im Erhaltungszeitraum: Fahren Sie so fort, als ob Sie die Anwendung nicht vergessen hätten. Tragen Sie die nächste Dosis wie gewohnt auf und setzen Sie die Behandlung fort.

Wenn Sie die Anwendung von Minoxidil Careforsons für Männer abbrechen

Nach dem Absetzen der Behandlung kann der Haarwuchs aufhören und die Alopezie innerhalb von 3 – 4 Monaten zurückkehren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen verursachen, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Falls Sie bei sich eines der folgenden Symptome bemerken, informieren Sie bitte unverzüglich einen Arzt, da Sie in einem solchen Fall möglicherweise dringend medizinische Hilfe benötigen:

- Schwellung des Gesichts, der Lippen oder des Halses, die das Schlucken oder Atmen erschwert; dies könnte ein Anzeichen für eine schwere allergische Reaktion sein (Häufigkeit nicht bekannt und auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar),
- geschwollene Hände oder Füße (häufig),
- anhaltende Rötung, Ausschlag oder Reizung der Kopfhaut (nicht bekannt),
- Schwindel (gelegentlich),
- rascher oder unregelmäßiger Herzschlag (selten),
- Schmerzen im Brustkorb (selten),
- niedriger Blutdruck (nicht bekannt),
- plötzliche unerklärliche Gewichtszunahme (häufig).

Andere mögliche Nebenwirkungen:

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen):

- Kopfschmerzen

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen):

- juckende Haut oder Ausschlag,
- übermäßiger Haarwuchs,
- Kurzatmigkeit bzw. Atemnot.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

- Übelkeit

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

- Reizung der Augen (einschließlich juckende Augen),
- Erbrechen,
- veränderte Farbe und/oder Beschaffenheit der Haare,
- in den ersten 2–6 Behandlungswochen kann es zu einem vorübergehenden Haarausfall kommen; dieser ist wahrscheinlich auf eine Änderung des Wachstumszyklus zurückzuführen und müsste nach wenigen Wochen wieder abklingen. Wenn die Haare länger als zwei Wochen lang ausfallen, setzen Sie dieses Arzneimittel ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Reaktionen an der Applikationsstelle wie Juckreiz, Irritation, Schmerzen, Ausschlag, Schwellung, trockene Haut und Rötung von Kopfhaut, Ohren und Gesicht, gelegentlich auch schwerere Reaktionen wie Abschälung, Dermatitis, Bläschen, Blutungen und Geschwüre),
- depressive Verstimmung

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn Website: <http://www.bfarm.de>. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Minoxidil Careforsons für Männer aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Dieses Arzneimittel darf nach dem auf dem Umkarton und der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwendet werden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem Öffnen innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.

Achtung: Lösung und Sprühnebel sind entflammbar. Von Hitze, Funken, offenen Flammen und heißen Oberflächen fernhalten. Während der Anwendung nicht rauchen. Flasche und Inhalt während der Anwendung, Lagerung und Entsorgung keinen offenen Flammen aussetzen. Flasche dicht geschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Minoxidil Careforsons für Männer enthält

- Der Wirkstoff ist Minoxidil. Jeder Milliliter (ml) Lösung enthält 50 mg Minoxidil. 1 ml entspricht 10 Sprühstößen.
- Die sonstigen Bestandteile sind Ethanol 96 %, Propylenglycol und gereinigtes Wasser.

Wie Minoxidil Careforsons für Männer aussieht und Inhalt der Packung

Minoxidil Careforsons für Männer Lösung zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) ist eine durchsichtige, farblose bis leicht gelbliche Lösung mit Alkoholgeruch. Das Arzneimittel ist in den folgenden Packungsgrößen erhältlich: 60 ml, 120 ml (2 Flaschen mit je 60 ml), 180 ml (3 Flaschen mit je 60 ml) und 240 ml (4 Flaschen mit je 60 ml) mit einer Sprühpumpe. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Careforsons Ireland Limited
Hamilton House
28 Fitzwilliam Place
Dublin 2
D02 P283
Irland

Hersteller

Industrial Farmacéutica Cantabria S.A.
Ctra. de Cazona-Adarzo, s/n
39011 SANTANDER
Spanien

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im **Oktober 2024**.

Sons®

Hair Growth Complex

Multivitamin + AnaGain™
60 capsules



Sons Hair Growth Complex is formulated to contribute to the maintenance of normal hair.

Sons Hair Growth Complex wurde entwickelt, um zum Erhalt von normalem Haar beizutragen.

Recommended intake: Take two capsules daily with a meal as part of a balanced diet and healthy lifestyle.

Ingredients/Inhaltsstoffe: Oryza Sativa Powder, Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC), Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Fish collagen (HYDROLYZED COLLAGEN), Acerola Cherry Extract (MALPIGHIA GLABRA FRUIT EXTRACT), Magnesium Oxide, Lysine Hydrochloride, Pisum Sativum Sprout Extract, Serenoa Serrulata Fruit Extract Powder, Copper Bisglycinate, Zinc Oxide, Biotin.

For Best Before End see bottom of the bottle/
Mindesthaltbarkeitsdatum siehe Gläschenboden
Made in the UK / Hergestellt in GB

Warning: Food supplements should not be used as a replacement for a balanced diet and healthy lifestyle. Do not exceed recommended daily dose. Do not use if the seal is broken. Store in a cool, dry place. Keep out of the sight and reach of young children.

Warnhinweise: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als ersatz für eine ausgewogene ernährung und gesunde lebensweise verwendet werden. Die empfohlene tägliche dosis nicht überschreiten. Nicht verwenden, wenn die versiegelung beschädigt ist. Kühl und trocken lagern. Außerhalb der reich- und sichtweite von kindern aufbewahren.

Food Supplement/Hair vitamin
Nahrungsergänzungsmittel/Haarvitamin
Made in the UK.



A551/UK/EU/A/03

Sons®

Strengthening Shampoo

Saw palmetto + caffeine
200ml e



Sons Shampoo is formulated with Saw Palmetto which can help reduce the amount of DHT on your scalp, helping your hair appear thicker and healthier. A fragrant blend of natural oils leaves hair smelling great.

Sons Shampoo ist mit Sägepalmenextrakt formuliert, das zu einer geringeren Menge von DHT auf der Kopfhaut beitragen kann, was das Haar dicker und gesünder erscheinen lässt. Eine duftende Mischung von natürlichen Ölen, die dem Haar einen wunderbaren Duft verleihen.

Instructions for use: Use daily. Apply to wet hair, massage for 90 seconds, then rinse.

Anwendungshinweise: Zur täglichen Anwendung, auf das nasse Haar auftragen, 90 Sekunden lang einmassieren, dann auswaschen.

Ingredients/Inhaltsstoffe: Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Methyl Isethionate, Capryl/Capryl Glucoside, Glycerin, Polysorbate 20, Phenylethanol, Lauryl Glucoside, Sodium Methyl Cocoyl Sulfonate, Citrus Sinesis (Orange) Peel Oil, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Coconut Acid, Potassium Sorbate, Sodium Gluconate, Sodium Lauryl Sarcosinate, Niacinamide, Polyquaternium-6, Caffeine, Fragrance (Parfum), Sodium Cocoyl Argan Oil Glycol Ether Esters, Biotin, Serenoa Serrulata Fruit Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Chloride, Tocopherol, Limonene.

Warning: Avoid contact with eyes. If product enters the eyes, rinse well with warm water. If irritation occurs, discontinue use.

Warnhinweise: Augenkontakt vermeiden. Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort gründlich mit warmem Wasser ausspülen. Bei Reizung Produkt nicht mehr verwenden.

Hair Care/Haarpflege – Sägepalme + argan
Made in the UK.

UK:
Careforsons Limited, Tintagel House,
92 Albert Embankment, London, SE1 7TY, UK
sons.co.uk

IE/DE:
Careforsons Ireland Limited, 28 Hamilton Place
Fitzwilliam Place, D02 P283, Dublin, Ireland
sons.ie; sons.de



BN & EXP: See closed end of tube.

AG09/02/1/07

Product Ingredient - INCI

Date: 02.05.2023
Product Name: Sons Strengthening Shampoo
Formula Ref: F1209602BLK

| | |
|---------------------------------------|--|
| Product Function^(f) | Hair Care |
| INCI List^(g) | <p>INGREDIENTS: Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Methyl Isethionate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Glycerin, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Lauryl Glucoside, Sodium Methyl Isethionate, Citrus Sinensis (Orange) Peel Oil, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Coconut Acid, Potassium Sorbate, Sodium Gluconate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Niacinamide, Polyquaternium-6, Caffeine, Fragrance (Parfum), Sodium Cocoate, Argan Oil Glycereth-8 Esters, Biotin, Serenoa Serrulata Fruit Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Chloride, Tocopherol, Limonene.</p> |