

**LIPACTIN® GEL, 175 I.E./g; 5 mg/g, gel**

Heparine natrium - Zinksulfaat



Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Waarvoor wordt Lipactin gel gebruikt?
2. Wanneer mag u Lipactin gel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Lipactin gel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Lipactin gel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

**1. WAARVOOR WORDT LIPACTIN GEL GEBRUIKT?**

Lipactin gel is een gel voor lokaal (topisch) uitwendig gebruik. Lipactin gel wordt gebruikt als een antivirale gel voor gebruik op de huid. Te gebruiken bij de behandeling van koortsblaasjes.

**2. WANNEER MAG U LIPACTIN GEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?****Wanneer mag u Lipactin gel niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Bij ernstige immunosuppressie (onderdrukking van de natuurlijke weerstand vb. door AIDS of beenmergtransplantatie).
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lipactin gel?**

- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Lipactin gel gebruikt.
- Lipactin gel is enkel bestemd voor uitwendig gebruik.
- Vermijd contact met de ogen.
- Stop de behandeling onmiddellijk bij het optreden van allergische (overgevoeligheids-) reacties.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Lipactin gel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

**Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Geen interacties gekend.

**Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Lipactin gel gedurende de zwangerschap en borstvoeding alleen gebruiken in overleg met uw arts.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

**3. HOE GEBRUIKT U LIPACTIN GEL?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**De gebruikelijke dosering is:**

Bij de eerste tekenen van een infectie (jeuk, trekkerig gevoel, pijn, blaasjesvorming) Lipactin gel 3 tot 6 keer per dag in een dun laagje op de aangetaste huid en lippen aanbrengen.

- Na het verdwijnen van de symptomen wordt de behandeling best nog enkele dagen voortgezet.
- Lipactin gel mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Neem contact op met uw arts als uw klacht niet betert, of erger wordt, na 10 dagen.

Lipactin gel is enkel voor uitwendig gebruik.

**Heeft u te veel van Lipactin gel gebruikt?**

Bij lokaal, uitwendig gebruik in de aangegeven hoeveelheid is er geen gevaar voor overdosering. Wanneer u te veel van Lipactin gel heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antgifocentrum (070/245.245).

**Bent u vergeten Lipactin gel te gebruiken?**

Als u een dosis bent vergeten, wacht dan tot de volgende dosis (maximaal 6 keer per dag).

**Als u stopt met het gebruik van Lipactin gel**

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.**

Zoals elk geneesmiddel kan ook Lipactin gel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Soms kan na het aanbrengen van de gel tijdelijk een branderig gevoel op de behandelde plaats optreden.
- In zeldzame gevallen kunnen allergische reacties voorkomen. Stop de behandeling onmiddellijk als allergische reacties voorkomen.

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Afdeling Vigilantie EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. HOE BEWAART U LIPACTIN GEL?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren op kamertemperatuur (15-25°C). Gebruik Lipactin gel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube/doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

**6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.****Welke stoffen zitten er in Lipactin gel**

- De werkzame stoffen in Lipactin gel zijn heparine natrium (175 I.E./g) en zinksulfaat (5 mg/g).
- De andere stoffen in Lipactin gel zijn glycerine 85% - fenoxoethanol - polysorbaat 60 - polysorbaat 80 - natriumcarboxymethylcellulose - gezuiverd water.

**Hoe ziet Lipactin gel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Tube met 3 gram gel.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant****Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Louis WIDMER N.V. - Louizalaan 486 - 1050 Brussel - België

**Fabrikant**

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:**

BE201257

**Afleveringswijze**

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 04/2016.

F

**LIPACTIN® GEL, 175 I.U./g; 5 mg/g, gel**

Héparine sodique - Sulfate de zinc

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

**Que contient cette notice**

1. Qu'est-ce que Lipactin gel et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Lipactin gel?
3. Comment utiliser Lipactin gel?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Lipactin gel?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE LIPACTIN GEL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?**

Lipactin gel est un gel pour usage local (topique) externe.

Lipactin gel est utilisé comme un gel antiviral à appliquer sur la peau. A utiliser pour le traitement des boutons de fièvre.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LIPACTIN GEL?****N'utilisez jamais Lipactin gel**

- Si vous êtes allergique au héparine sodique ou au sulfate de zinc ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- En cas d'immunodépression grave (répression de la résistance naturelle p. ex. par le SIDA ou une transplantation de moelle osseuse).
- Chez les enfants de moins de 6 ans.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Lipactin gel.

- Lipactin gel est exclusivement destiné à un usage externe.
- Evitez le contact avec les yeux.
- Arrêtez le traitement immédiatement si des réactions allergiques (hypersensibles) se présentent.

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

**Autres médicaments et Lipactin gel**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé ou pourriez prendre/utiliser tout autre médicament.

**Lipactin gel avec des aliments et boissons**

Aucune interaction connue.

**Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

N'utilisez Lipactin gel pendant la grossesse et l'allaitement qu'après avoir demandé l'avis de votre médecin.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Aucune précaution particulière n'est nécessaire.

**3. COMMENT UTILISER LIPACTIN GEL?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**La dose recommandée est:**

Aux premiers signes d'infection (démangeaisons, sensation de



Bornem

Rijksweg 18

B-2880 Bornem

☎ +32 (0)3 889 22 63

☎ +32 (0)3 890 67 20

✉ prepress.bornem@multiplkg.com

**QUALIPHAR**

Item Code:	Proof number:
30012005-8	02

Product Description: .....	LIPACTIN BELGIE
Languages: .....	NL - FR - D
Dimensions (mm): .....	297 x 148
Folded (mm): .....	22,5 - 2 x 148
Grammage: .....	
Type: .....	Helvetica LTStd
Text size (body text): .....	6,6 pt
Created: .....	Indesign CC
Operator: .....	Lieve Vancraeynest
Pharmacode: .....	
Visual code: .....	64 - 68 - 76
PG number: .....	364118
Date: .....	25 mei 2016
Contact: .....	Maureen Behiels

**Colours used:**

zwart

**FRONT  
1/2**Approved by  
Signature

Approval Date

tiraillement, douleur, apparition d'un bouton), appliquer 3 à 6 fois par jour une mince couche de Lipactin gel sur la peau et la lèvre atteinte.

- Après disparition des symptômes, il est préférable de poursuivre le traitement pendant quelques jours.
- N'utilisez jamais Lipactin gel chez les enfants de moins de 6 ans.

Consultez un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent, après 10 jours.

Lipactin gel est exclusivement destiné à un usage externe.  
**Si vous avez utilisé plus de Lipactin gel que vous n'auriez dû**  
 En utilisation locale externe aux doses recommandées, il n'y a aucun risque de surdosage. Si vous avez utilisé ou pris trop de Lipactin gel, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

**Si vous oubliez d'utiliser Lipactin gel**  
 N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser (maximum 6 fois par jour).

**Si vous arrêtez d'utiliser Lipactin gel**  
 Non applicable.  
 Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS?**

Comme tous les médicaments, Lipactin gel peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Parfois l'application du gel peut être temporairement accompagnée d'une sensation de brûlure à l'endroit traité.
- Dans de rares cas, des réactions allergiques ont été décrites. Arrêtez le traitement immédiatement si des réactions allergiques se présentent.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.  
 Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles  
 Site internet: www.afmps.be  
 e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be  
 En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. COMMENT CONSERVER LIPACTIN GEL?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. A conserver à température ambiante (15-25°C). N'utilisez pas Lipactin gel après la date de péremption indiquée sur le tube/la boîte après « EXP ». Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux ou quatre derniers l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

**6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.**

**Le contenu de Lipactin gel**

- Les substances actives sont héparine sodique (175 I.U./g) et sulfate de zinc (5 mg/g).
- Les autres composants sont glycérine 85% - phénoxyéthanol - polysorbate 60 - polysorbate 80 - carboxyméthylcellulose sodique - eau purifiée.

**Aspect de Lipactin gel et contenu de l'emballage extérieur**

Tube de 3 grammes gel.

**Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché:  
 Louis WIDMER N.V. - Avenue Louise 486 - 1050 Bruxelles - Belgique

Fabricant:  
 Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgique

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché:** BE201257

**Mode de délivrance**  
 Délivrance libre.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 04/2016.**

**D**  
**LIPACTIN® GEL, 175 I.U./g; 5 mg/g, Gel**  
 Heparin-Natrium - Zinksulfat

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Lipactin Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Lipactin Gel beachten?
3. Wie ist Lipactin Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Lipactin Gel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

**1. WAS IST LIPACTIN GEL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Lipactin Gel ist ein Gel zur lokalen (topischen) äußeren Anwendung. Lipactin Gel ist ein antivirales Gel zum Auftragen auf die Haut. Angezeigt zur Behandlung von Fieberbläschen.

**2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LIPACTIN GEL BEACHTEN?**

**Lipactin Gel darf nicht angewendet werden,**

- Wenn Sie allergisch gegen Heparin-Natrium oder Zinksulfat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- Bei schwerer Immunsuppression (Patienten mit stark geschwächtem Immunsystem, beispielsweise bei AIDS oder nach einer Knochenmarktransplantation).
- Bei Kindern unter 6 Jahren.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Lipactin Gel anwenden.

- Lipactin Gel ist nur für den äußerlichen Gebrauch bestimmt.
- Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen.
- Brechen Sie die Behandlung sofort ab, bei Auftreten allergischer Reaktionen (Überempfindlichkeit).

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn eine der obigen Warnungen auf Sie zutrifft oder dies in der Vergangenheit der Fall war.

**Anwendung von Lipactin Gel zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen bzw. angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen bzw. anzuwenden.

**Anwendung von Lipactin Gel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Keine Interaktionen bekannt.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Lipactin Gel während der Schwangerschaft und der Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Keine besondere Vorsichtsmaßnahmen notwendig.

**3. WIE IST LIPACTIN GEL ANZUWENDEN?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

**Die empfohlene Dosis beträgt:**

Bei den ersten Anzeichen einer Infektion (Juckreiz, Spannungsgefühl, Schmerzen, Bläschenbildung) Lipactin Gel 3- bis 6-mal täglich in dünner Schicht auf die betroffenen Hautstellen und Lippen auftragen.

- Nach dem Verschwinden der Symptome wird die Behandlung vorzugsweise einige Tage fortgesetzt.
- Lipactin Gel darf nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Beschwerden nach 10 Tagen nicht besser oder sogar schlechter werden.

Lipactin Gel ist nur für äußerlichen Gebrauch.

**Wenn Sie eine größere Menge von Lipactin Gel angewendet haben, als Sie sollten**

Bei lokaler äußerer Anwendung in der angegebenen Menge gibt es keine Gefahr einer Überdosierung.  
 Wenn Sie eine größere Menge von Lipactin Gel angewendet haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

**Wenn Sie die Anwendung von Lipactin Gel vergessen haben**

Wenn Sie eine Anwendung vergessen haben, warten Sie bis zur nächsten Anwendung (maximal 6 Mal pro Tag).

**Wenn Sie die Anwendung von Lipactin Gel abbrechen**

Nicht zutreffend.  
 Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch Lipactin Gel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- In Einzelfällen kann es nach dem Auftragen des Gels vorübergehend zu einem Brennen an der behandelten Stelle kommen.
- In seltenen Fällen können allergische Reaktionen auftreten. Brechen Sie die Behandlung sofort ab bei Auftreten allergischer Reaktionen (Überempfindlichkeit).

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über Förderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte - Abteilung Vigilanz, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 Brüssel  
 Website: www.fagg-afmps.be  
 E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be  
 Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. WIE IST LIPACTIN GEL AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Bei Zimmertemperatur lagern (15-25°C). Sie dürfen Lipactin Gel nach dem auf der Tube/dem Umkarton nach „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Die ersten beiden Ziffern geben den Monat, die folgenden zwei oder vier Ziffern das Jahr an. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

**6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONS.**

**Was Lipactin Gel enthält**

- Die Wirkstoffe sind Heparin-Natrium (175 I.U./g) und Zinksulfat (5 mg/g).
- Die sonstigen Bestandteile sind Glycerin 85% - Phenoxyethanol - Polysorbat 60 - Polysorbat 80 - Natriumcarboxymethylcellulose - Gereinigtes Wasser.

**Wie Lipactin Gel aussieht und Inhalt der Packung**

Tube mit 3 Gramm Gel.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

**Pharmazeutischer Unternehmer**  
 Louis WIDMER N.V. - Avenue Louise 486 - 1050 Brüssel - Belgien

**Hersteller**  
 Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgien

**Zulassungsnummer:** BE201257

**Art der Abgabe**  
 Freie Abgabe.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt genehmigt im 04/2016.**



**Bornem**  
 Rijksweg 18  
 B-2880 Bornem  
 ☎ +32 (0)3 889 22 63  
 📠 +32 (0)3 890 67 20  
 ✉ prepress.bornem@multiplkg.com

**QUALIPHAR**

Item Code:	Proof number:
30012005-8	02

Product Description: .....LIPACTIN BELGIE  
 Languages: ..... NL - FR - D  
 Dimensions (mm): ..... 297 x 148  
 Folded (mm): .....22,5 - 2 x 148  
 Grammage: .....  
 Type: ..... Helvetica LTStd  
 Text size (body text): .....6,6 pt  
 Created: ..... Indesign CC  
 Operator: ..... Lieve Vancraeynest  
 Pharmacode: .....  
 Visual code: ..... 64 - 68 - 76  
 PG number: .....364118  
 Date: ..... 25 mei 2016  
 Contact: ..... Maureen Behiels

Colours used:

  
 zwart

**BACK**  
**2/2**

Approved by \_\_\_\_\_ Approval Date \_\_\_\_\_  
 Signature